

مطالعه همراهی پلی مورفیسم rs6062314 در ژن tnfrsf6b در جمعیت مردان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تک گیر در استان خوزستان

سمیرا زیدعلی^۱، کیومرث صفی نژاد*^۲، حمید گله داری^۳

تاریخ دریافت ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ تاریخ پذیرش ۱۳۹۵/۰۸/۲۸

چکیده

پیش زمینه و هدف: بیماری مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری خودایمن، دمیلینه کننده و تخریب کننده سیستم اعصاب مرکزی است. آسیب شناسی این بیماری تاکنون مشخص نشده است، اگرچه شواهدی حاکی از تأثیر عوامل محیطی بر افراد دارای استعداد ژنتیکی وجود دارد. پروتئین TNFRSF6B در انسان توسط ژن tnfrsf6b تولید می گردد. یکی از عملکردهای بیولوژیکی TNFRSF6B، عمل کردن به عنوان تله مرگ و جلوگیری از مرگ سلولی تحت شرایط خاص است. چند نمونه از مطالعات انجام شده، نشان داده است که پلی مورفیسم rs6062314 ژن tnfrsf6b با خطر ابتلا به MS همراهی دارد. هدف از این مطالعه بررسی همراهی پلی مورفیسم rs6062314 در ژن tnfrsf6b در جمعیت مردان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تک گیر در استان خوزستان بود.

مواد و روش کار: نوع مطالعه موردی- شاهد بوده و در این مطالعه ۱۰۰ نفر شامل تعداد ۵۰ مرد مبتلا به MS با سطح پایین و متوسط بیماری EDSS≤۳ و ۵۰ مرد سالم در این مطالعه با استفاده از روش های مولکولی شامل استخراج DNA و PCR- Sequencing مورد بررسی قرار گرفتند. **یافته ها:** فراوانی آللی و ژنوتیپی T/C rs6062314 ژن tnfrsf6b در بین بیماران مبتلا به MS و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت (P=0/268) و (P=1/0) و برای آلل C (0/61 - 15/89) CI = 95% OR=3/128 می باشد.

بحث و نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که ارتباطی بین پلی مورفیسم SNP rs6062314 ژن tnfrsf6b و بیماری MS وجود ندارد.

کلیدواژه ها: مالتیپل اسکلروزیس، پلی مورفیسم rs6062314، SNP، ژن tnfrsf6b، خوزستان

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و هفتم، شماره دهم، ص ۸۶۲-۸۵۶ دی ۱۳۹۵

آدرس مکاتبه: بروجرد، میدان مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، تلفن: ۰۹۱۲۱۵۱۰۷۳۱

Email: q_safinejad@yahoo.com

مقدمه

تاکنون بیش از ۱۰۰ واریانت ژنتیکی در ژن های غیر وابسته به MHC در ارتباط با MS شناخته شده است. این واریانت ها بیشتر مربوط به ژن هایی هستند که در سیستم ایمنی نقش دارند. همچنین این واریانت ها در مناطق تنظیمی ژن بیشتر از مناطق کد کننده واقع شده اند.

پروتئین TNFRSF6B (Tumor Necrosis Factor Receptor Super Family) عضو 6B از سوپر خانواده رسپتور فاکتور نکروز تومور می باشد که تحت عنوان TR6، DcR3، M68 نیز شناخته می شود. این پروتئین در سال ۱۹۹۸ شناسایی شد. پروتئین TNFRSF6B در انسان توسط ژنی به همین نام تولید می گردد (۱). TNFRSF6B فاقد دومین های سیتوزولی و

ویژگی مشترک همه بیماری های خود ایمنی وجود آنتی بادی های خودواکنش گر و التهاب است که در اثر فعالیت فاگوسیت ها، لنفوسیت های T خودواکنش گر و پلاسماسل ها ایجاد می شوند. مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری خودایمنی مرتبط با التهاب سیستم اعصاب مرکزی انسان، همچنین یک بیماری مولتی فکتوریال است که هر دو فاکتور ژنتیک و محیط در آسیب شناسی فیزیولوژیک آن نقش دارند. به طور کلی دودسته ژن در استعداد ابتلا به MS نقش دارند:

۱- ژن های وابسته به MHC

۲- ژن های غیر وابسته به MHC (۱).

^۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

^۲ استادیار زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول)

^۳ استاد ژنتیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، اهواز، ایران

پاراکلینیکی (آزمایشگاهی و تصویربرداری)، مورد بررسی قرار گرفتند. فقط بیماران مبتلا به نوع عودکننده- فروکش کننده مالتیپل اسکروزیس در مدت ۲ سال که هیچ تشدید در سه ماهه گذشته نداشتند، در مطالعه وارد شدند. نمونه گیری بیماران در انجمن MS خوزستان و با رضایت کامل بیماران برای انجام این مطالعه صورت پذیرفت (از بیماران رضایت نامه کتبی دریافت گردید). وضعیت ناتوانی آن‌ها با مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده (EDSS) Kurtzke اندازه گیری شد (۸). گروه کنترل شامل ۵۰ مرد سالم که از نظر سن و قومیت با گروه بیمار مطابقت داشته و همچنین بدون سابقه بیماری خودایمن بودند و با آگاهی کامل و پس از ارائه رضایت نامه کتبی در این مطالعه شرکت نمودند.

از کلیه بیماران و گروه کنترل حدود ۵ میلی لیتر خون گرفته و در لوله های فالكون حاوی ۰/۵ میلی لیتر محلول ۰/۵ مولار اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) به عنوان ماده ضد انعقاد جمع آوری شد. سپس نمونه ها در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری گردید تا برای مرحله بعد مورد استفاده قرار گیرد. ژنوتیپ پلی مورفیسم ژن *tnfrsf6b* (rs6062314 T/C) با استفاده از PCR و روش توالی یابی سانجر مشخص شد. پرایمرهای انتخاب شده ی ما در این مطالعه دارای خصوصیات ذکر شده در جدول ۱ می باشند. واکنش PCR در حجم نهایی ۲۵ μl و با برنامه حرارتی و زمانی شامل دناتوراسیون اولیه در ۹۴°C به مدت ۳ دقیقه، دناتوراسیون ثانویه در ۹۴°C که توسط ۳۵ سیکل دناتوراسیون به مدت یک دقیقه دنبال شد، دمای آنیلینگ (۶۰°C، یک دقیقه) و دمای گسترش (۷۲°C، ۴۵ ثانیه) انجام شد. واکنش، بعد از گسترش نهایی در ۷۲°C به مدت ۴ دقیقه به پایان رسید. ۵ میکرو لیتر از محصولات PCR بر روی ژل آگارز ۱/۵ درصد load شد و باندهای خاص توسط safe stain DNA (سیناژن، تهران، ایران) قابل مشاهده گردید. پس از استخراج DNA از نمونه های مختلف و تکثیر کردن توالی مورد نظر به کمک PCR، نمونه ها به همراه پرایمر Reverse به منظور توالی یابی ارسال شدند.

ترانس ممبران در توالی خود بوده و یک پروتئین ترشحی است (۲). با تجزیه و تحلیل ترکیبی پرتو و از طریق اتصال به یک مارکر، نقشه ژن *tnfrsf6b* روی کروموزوم 20q13 معین شد. توالی DNA این ژن که روی کروموزوم ۲۰ قرار دارد، رونوشتی دارای ۷ اگزون و ۶ اینترون با طول ۳/۶ kb را شامل می شود. TNFRSF6B می تواند به اعضای خانواده LIGHT, FasL, TNF و TL1A متصل شود و در نتیجه تعامل TNFRSF6B با LIGHT, FasL و TL1A آپوپتوز ناشی از Fas, LTβR, و DR3 را مسدود می کند (۴-۲). پلی مورفیسم در نزدیکی ژن های کدکننده اعضای *tnfrsf6b*; *tnfrsf* و *tnfrsf14* اخیراً با دو بیماری مختلف خودایمنی، بیماری کرون و آرتریت روماتوئید همراهی نشان داده است، همچنین پلی مورفیسم مربوط به هر دو ژن *tnfrsf14* و *tnfrsf6b*، با خطر ابتلا به بیماری MS همراه بود (۶-۵).

در این تحقیق ارتباط بین پلی مورفیسم *rs6062314(tnfrsf6b)* و بیماری مالتیپل اسکروزیس در جمعیت مردان مبتلا به مالتیپل اسکروزیس تک گیر در استان خوزستان را مورد بررسی قرار دادیم. ارتباط پلی مورفیسم *rs6062314(tnfrsf6b)* با بیماری MS، باعث تشخیص بیشتر پاتوژن های MS و محدود کردن افراد از عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به این بیماری می شود. در این مطالعه ما ژنوتیپ SNP *tnfrsf6b* (rs6062314 T/C) واقع در ناحیه اینترونی ژن *tnfrsf6b* در مردان بیمار مبتلا به ام اس و گروه کنترل در استان خوزستان را تعیین کردیم. همچنین احتمال همراهی هر ژنوتیپ و آلل را با استعداد ابتلا به ام اس مورد بررسی قرار دادیم.

مواد و روش کار

در این مطالعه از ۵۰ مرد مبتلا به مالتیپل اسکروزیس که توسط پزشک متخصص و بر اساس معیار تشخیص McDonald (۷) تأیید تشخیص گرفته، نمونه گیری انجام شد. تمامی بیماران در جمعیت مورد مطالعه، مبتلا به نوع RRMS بودند. تمام بیماران برای سوابق پزشکی فعلی و گذشته از قبیل تست های مغز و اعصاب و داده های

جدول (۱): مشخصات پرایمرهای رفت و برگشت برای *tnfrsf6b*(rs6062314)

Name	Primer sequence	Tm
<i>tnfrsf6b</i> (rs6062314) F	5'- g a y t g t g c t g a t g g c t a c a g g a - 3'	57/6°C
<i>tnfrsf6b</i> (rs6062314) R	5'- t t c c a g g g t g t t g c a g a y g t c - 3'	60/4°C

یافته‌ها

در این تحقیق جمعیت ۵۰ نفری از بیماران مرد مبتلا به MS در استان خوزستان که بیماری آن‌ها توسط متخصصین نورولوژی بر اساس معیار Revised McDonald تشخیص داده شد، مورد بررسی قرار گرفتند. همه بیماران مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده (EDSS) کم‌تر از ۴ داشتند.

ما (rs6062314) SNP واقع در ژن *tnfrsf6b* را در ۵۰ مرد بیمار و ۵۰ کنترل همسان سالم تعیین ژنوتیپ کردیم. بر اساس نتایج حاصل از الکتروفورز محصولات PCR، باند مربوط به ژن

tnfrsf6b ۴۲۵ bp می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که SNP ژن *tnfrsf6b* در جمعیت ما پلی مورفیسم نیست. جدول‌های ۲ و ۳ فراوانی آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم rs6062314 را در بیماران مبتلا به MS و کنترل‌های سالم نشان می‌دهد. تفاوت معنی‌دار آماری در توزیع آلل‌ها و ژنوتیپ‌های rs6062314 ژن *tnfrsf6b* بین بیماران و کنترل‌های سالم وجود ندارد ($P_{TC}=0/268$) و ($P_{CC}=1/0$) و برای آلل C $OR=3/128$, 95% CI = (0/61 - 15/89) -.

جدول (۲): توزیع فراوانی آللی پلی مورفیسم ژن *tnfrsf6b* و خطر همراهی با بیماری MS

P value	OR (% 95 CI)	PATIENT	Control	Allele
-	1 (Reference)	0/94	0/98	T
0/279	3/128 (0/61 - 15/89)	0/06	0/02	C

P-value < 0/05 .OR: odds ratio CI: confidence intervals

جدول (۳): توزیع فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم ژن *tnfrsf6b* و خطر همراهی با بیماری MS

Genotype	OR (% 95 CI)		P value
	Control N = 50 (%)	Patient N = 50 (%)	
TT	48 (96)	44 (88)	1 (Reference)
TC	2 (4)	6 (12)	3/27 (0/63 - 17/08)
CC	0 (0)	0 (0)	1/10 (0/02 - 56/15)

P-value < 0.05 .OR: odds ratio CI: confidence intervals

با توجه به نتایج حاصله که در جدول و نمودار آورده شده، هیچ ارتباط معنی‌داری بین بیماران وجود ندارد.


جدول (۴): فراوانی ژنوتیپی و OR پلی مورفیسم ژن *tnfrsf6b* در بیماران MS با درجه ناتوانی (EDSS) مختلف

Genotype	EDSS 0-1.5	EDSS 2-3	OR (% 95 CI)	P value
TT	28	16	1 (Reference)	
TC	5	1	0/35 (0/03 - 3/26)	0/65


ژنوتیپ‌ها و EDSS نتایج حاصل از بررسی میانگین EDSS در ژنوتیپ‌های TT و TC، در جدول و نمودار آورده شده است.

جدول (۵): بررسی میانگین EDSS در ژنوتیپ‌های مشاهده شده

Genotype	MS N=50		P value
	Mean	Std. Error of Mean	
TT	1/216 ± 0/88	0/13	0/427
TC	0/917 ± 0/917	0/37	



نمودار (۱): توزیع فراوانی ژنوتیپی در بیماران MS با EDSS مختلف



نمودار (۲): میانگین EDSS در ژنوتیپ‌های مختلف بیماران MS

می‌تواند به شناسایی سبب‌زایی بیماری و در نتیجه به درمان آن بیماری کمک کند. مطالعات انجام گرفته در طول دهه گذشته نشان داده‌اند، تعداد ژن‌ها و لوکوس‌های شناسایی شده که مستعدکننده این بیماری و سایر بیماری‌های پیچیده می‌باشند، افزایش یافته‌اند. مطالعات همراهی گسترده ژنومی (GWAS)، عوامل ژنتیکی دیگری را شناسایی کرده‌اند؛ مثلاً در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ در اروپا بر روی ۱۴۴۹۸ بیمار مبتلا به MS و ۲۴۰۹۱ کنترل برای SNP۱۶۱۳۱۱ اتوزومال مورد بررسی قرار گرفت که ۱۳۵ منطقه مرتبط بالقوه و ۴۸ واریانت خطر جدید برای MS در بیرون از ناحیه HLA معین شد که پلی‌مورفیسم ژن *tnfrsf6b* (rs6062314) را نیز شامل می‌شود (۹). در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۱ در اسپانیا بر

بحث و نتیجه‌گیری

مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری خودایمن، التهابی، دمیلینه‌کننده سیستم اعصاب مرکزی انسان است و جزء بیماری‌های چند فاکتوری به شمار می‌رود زیرا ژن‌های بسیار زیادی در بروز این بیماری دخیل هستند. علاوه بر نقش ژن‌ها در بروز این بیماری میان‌کنش‌های بین‌ژنی و محیط نیز در بروز این بیماری تأثیرگذار هستند. بیماری‌های چندژنی چند فاکتوری مانند بیماری MS مکانیسم مولکولی ناشناخته‌ای دارند. اکثر ژن‌های درگیر در ایجاد استعداد به این بیماری، در دسته ژن‌های دخیل در سیستم ایمنی می‌باشند؛ بنابراین مطالعه فراوانی آلل‌هایی که نقش احتمالی در ایجاد بیماری MS دارند، موضوع بسیاری از تحقیقات است که

بررسی پلی مورفیسم از روش PCR و توالی‌یابی سانجر استفاده کردیم.

از نظر درجه‌ی ناتوانی (EDSS) نیز بیشترین افراد در جمعیت ما درجه‌ی ناتوانی بین ۰-۲ داشتند و فراوانی بیماران با درجه‌ی ناتوانی ۳ بسیار کم بود.

همان‌طور که نتایج این بررسی نشان داد، فراوانی آلل‌های T و C ژن *tnfrsf6b* در جمعیت کنترل و جمعیت بیمار اختلاف چندانی نداشت، در جمعیت بیمار فراوانی آلل T (۹۴ درصد) و فراوانی آلل C (۶ درصد) و در جمعیت کنترل فراوانی آلل T (۹۸ درصد) و فراوانی آلل C (۲ درصد) بود. آلل C با بیماری MS در جمعیت مورد مطالعه‌ی ما از لحاظ آماری همراهی معنی‌داری نشان نداد ($P=0/279$).

در این پژوهش ارتباط بین ژنوتیپ‌های TC و CC با خطر ابتلا به MS در جمعیت بیمار و کنترل مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط معنی‌داری در این مورد نیز مشاهده نشد ($P_{Value_{TC}}=0/268$) و ($P_{Value_{CC}}=1/0$). همچنین با توجه به نتایج حاصله هیچ ارتباط معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها و EDSS بیماران در جمعیت مورد مطالعه وجود نداشت ($P_{Value}=0/65$). نتیجه‌گیری کلی نشان داد که بین پلی مورفیسم rs6062314 ژن *tnfrsf6b* و بیماری مالتیپل اسکلروزیس در مردان مبتلا به MS استان خوزستان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. با وجود این نتیجه‌گیری پیشنهاد می‌گردد مطالعاتی با تعداد نمونه‌های بیشتر از سایر تایپ‌ها صورت گیرد تا همراهی پلی مورفیسم rs6062314 ژن *tnfrsf6b* در تایپ‌های مختلف بیماری MS به‌خوبی بررسی شود. همچنین برای بررسی دقیق‌تر همراهی این پلی مورفیسم با EDSS بیماران مبتلا به MS، مطالعاتی در جمعیت‌هایی با طیف گسترده‌تری از EDSS انجام گیرد و به‌صورت جامع‌تر مورد مطالعه قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

از کلیه بیماران و خانواده‌های آن‌ها که در این مطالعه شرکت نمودند، صمیمانه تشکر می‌نماییم.

References:

1. Pitti R M, Marsters S A, Lawrence D A, Roy M, Kischkel F C, Dowd P, Godowski P J. Genomic amplification of a decoy receptor for Fas ligand in

روی ۱۳۷۰ بیمار مبتلا به MS و ۱۷۱۵ فرد سالم انجام شد، پلی مورفیسم‌های (*rs4809330*) *tnfrsf6b* و (*rs6684865*) *tnfrsf14* با خطر ابتلا به بیماری MS همراهی نشان داد (۶). TNFRSF6B به خانواده گیرنده فاکتور نکروز تومور تعلق دارد (۱)، اما فاقد دومین گذرنده از غشاء است؛ بنابراین یک پروتئین ترشحی است (۲). TNFRSF6B می‌تواند به اعضای خانواده TNF FasL, LIGHT و TL1A متصل شود و تعامل آن‌ها را با گیرنده‌های مربوطه به‌عنوان مثال Fas، پروتئین واسطه ورود ویروس هرپس (HVEM) و گیرنده محتوی دومین مرگ DR3، مسدود کند (۳-۴). TNFRSF6B نقش واضحی در آپوپتوز دارد. FasL یک مولکول شناخته شده درگیر در آپوپتوز است. LIGHT یک لیگاند برای پروتئین HVEM و LTβR، به‌علاوه یک لیگاند برای TNFRSF6B می‌باشد (۱۰). LIGHT می‌تواند آپوپتوز را در سلول‌هایی که هر دو پروتئین HVEM و LTβR (۱۱) یا فقط LTβR (۱۲) را بیان می‌کنند، القاء کند. TL1A یک عضو شناخته شده خانواده TNF می‌تواند آپوپتوز را از طریق گیرنده خود، DR3 ایجاد کند (۴).

بافت و سلول‌های طبیعی سطح پایین *tnfrsf6b* را بیان می‌کنند و افراد سالم نزدیک به سطح TNFRSF6B سرم پایه دارند. *tnfrsf6b* در برخی از بافت‌های نرمال از جمله روده بزرگ، معده، طحال، غدد لنفاوی، نخاع، پانکراس و ریه بیان می‌شود (۱۳ و ۱). *tnfrsf6b* عمدتاً در سلول‌های تومور از جمله ریه و سرطان روده (۱)، تومورهای دستگاه گوارش (۱۳) و ویروس‌های مرتبط با لوسمی (۱۴)، بیان بالا دارد.

همچنین بیان آن در بیماری‌های مختلف خودایمنی و التهابی مانند IBD^۱، SLE^۲ و RA^۳، افزایش یافته است (۱۶-۱۵). در تحقیق حاضر، ما پلی مورفیسم rs6062314 ژن *tnfrsf6b* را در ۵۰ مرد از بیماران مبتلا به MS که در انجمن MS خوزستان ثبت‌نام کرده بودند و بیماری آن‌ها توسط متخصص نورولوژی تأیید شده بود و ۵۰ مرد سالم به‌عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار دادیم و به‌منظور

lung and colon cancer. Nature 1998;396(6712): 699-703.

2. Zhang J, Salcedo T W, Wan X, Ullrich S, Hu B, Gregorio T, Li Y. Modulation of T-cell responses

³ Rheumatoid arthritis

¹ Inflammatory bowel disease

² Systemic lupus erythematosus

- to alloantigens by TR6/DcR3. *J Clinical Investigation* 2001; 107(11): 1459.
3. Bai C, Connolly B, Metzker M L, Hilliard CA, Liu X, Sandig V, et al. Overexpression of M68/DcR3 in human gastrointestinal tract tumors independent of gene amplification and its location in a four-gene cluster. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2000;97(3): 1230-5.
 4. Migone T S, Zhang J, Luo X, Zhuang L, Chen C, Hu B, et al. TL1A is a TNF-like ligand for DR3 and TR6/DcR3 and functions as a T cell costimulator. *Immunol* 2002; 16(3): 479-92.
 5. Raychaudhuri S, Remmers E F, Lee A T, Hackett R, Guiducci C, Burt N P, et al. Common variants at CD40 and other loci confer risk of rheumatoid arthritis. *Nature genetics* 2008; 40(10): 1216-23.
 6. Blanco-Kelly F, Alvarez-Lafuente R, Alcina A, Abad-Grau MM, de Las Heras V, Lucas M, et al. Members 6B and 14 of the TNF receptor superfamily in multiple sclerosis predisposition. *Genes Immun* 2011;12(2):145-8.
 7. Polman CH, Reingold SC, Edan G, Filippi M, Hartung H-P, Kappos L, et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the "McDonald Criteria." *Ann Neurol* 2005;58(6):840-6.
 8. Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). *Neurology* 1983;33(11):1444-52.
 9. International Multiple Sclerosis Genetics Consortium. Analysis of immune-related loci identifies 48 new susceptibility variants for multiple sclerosis. *Nature genetics* 2013;45(11):1353-60.
 10. Mauri DN, Ebner R, Montgomery RI, Kochel KD, Cheung TC, Yu GL, et al. LIGHT, a new member of the TNF superfamily, and lymphotoxin alpha are ligands for herpesvirus entry mediator. *Immunity* 1998;8(1):21-30.
 11. Zhai Y, Guo R, Hsu TL, Yu GL, Ni J, Kwon BS, et al. LIGHT, a novel ligand for lymphotoxin beta receptor and TR2/HVEM induces apoptosis and suppresses in vivo tumor formation via gene transfer. *J Clin Invest* 1998;102(6):1142-51.
 12. Rooney IA, Butrovich KD, Glass AA, Borboroglu S, Benedict CA, Whitbeck JC, et al. The lymphotoxin-beta receptor is necessary and sufficient for LIGHT-mediated apoptosis of tumor cells. *J Biol Chem* 2000;275(19):14307-15.
 13. Bamias G, Kaltsa G, Siakavellas SI, Papaxoinis K, Zampeli E, Michopoulos S, et al. High intestinal and systemic levels of decoy receptor 3 (DcR3) and its ligand TL1A in active ulcerative colitis. *Clin Immunol* 2010;137(2):242-9.
 14. Funke B, Autschbach F, Kim S, Lasitschka F, Strauch U, Rogler G, et al. Functional characterisation of decoy receptor 3 in Crohn's disease. *Gut* 2009;58(4):483-91.
 15. Kugathasan S, Baldassano RN, Bradfield JP, Sleiman PMA, Imielinski M, Guthery SL, et al. Loci on 20q13 and 21q22 are associated with pediatric-onset inflammatory bowel disease. *Nat Genet* 2008;40(10):1211-5.
 16. Lee C-S, Hu C-Y, Tsai H-F, Wu C-S, Hsieh S-L, Liu L-C, et al. Elevated serum decoy receptor 3 with enhanced T cell activation in systemic lupus erythematosus. *Clin Exp Immunol* 2008;151(3):383-90.

ASSOCIATION STUDY OF THE RS6062314 POLYMORPHISM IN THE TNFRSF6B GENE IN MEN POPULATION WITH SPORADIC MULTIPLE SCLEROSIS IN KHUZESTAN PROVINCE

Samira Zaidali¹, Kyumars Safinejad^{2*}, Hamid Galehdari³

Received: 17 Sep, 2016; Accepted: 18 Nov, 2016

Abstract

Background & Aims: Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune, demyelinating and neurodegenerative disease of the central nervous system (CNS). The pathogenesis of this disease is still unknown, although there are evidences of environmental factors affecting subjects with genetic predisposition factors. TNFRSF6B protein in human is coded by the tnfrsf6b gene. One of the biological functions of TNFRSF6B is that it acts as death decoy and prevents cell death under certain circumstances. Some examples of studies have shown that rs6062314 (tnfrsf6b) polymorphism is associated with risk of MS. The aim of this study was to investigate the association of rs6062314 polymorphism in tnfrsf6b gene in men population with sporadic multiple sclerosis in Khuzestan province.

Materials & Methods: The type of study was case-control and 100 unrelated subjects including 50 patients with low and moderate levels of MS (EDSS \leq 3) and 50 healthy men were enrolled and molecular techniques were used; in addition, extraction of DNA, PCR, and direct sequencing were studied.

Results: The genotype and allele frequencies of rs6062314 (tnfrsf6b) between MS patients and controls did not differ significantly (P-value=0.268 and P CC=1.0 and OR = 3.128, 95% CI = 0.61-15.89 for C allele).

Conclusion: Our results showed that there was no association between rs6062314 (tnfrsf6b) SNP polymorphism and MS disease.

Keywords: Multiple Sclerosis, rs6062314 polymorphism, tnfrsf6b gene, Khuzestan

Address: Basic Science College, Broojerd Branch, Islamic Azad University, Broojerd, Iran

Tel: +989121510731

Email: q_safinejad@yahoo.com

SOURCE: URMIA MED J 2017; 27(10): 862 ISSN: 1027-3727

¹ M.Sc. Department of Biology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

² Assistant Professor, Department of Biology, Basic Science College, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran (Corresponding Author)

³ Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran