

ارزیابی غلظت سرمی نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به سندروم جریان آهسته کرونری

مهدثه نعمتی^۱، یوسف رسمی^۲، محمدحسن خادم انصاری^۳، سانا ز فرامرز گزنق^۴، میرحسین سیدمحمدزاد^۵، نرمن مکاریزاده^۶

تاریخ دریافت ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ تاریخ پذیرش ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: سندروم جریان آهسته کرونری (SCF) پدیده‌ای است که با آنژیوگرافی نرمال یا نزدیک به نرمال شریان کرونری همراه است که با جریان آهسته ماده حاجب تزریق شده به عروق کرونری شناخته می‌شود. اتیولوژی این بیماری ناشناخته است. نقص عملکرد اندوتیال یکی از عوامل اصلی اتیولوژی بیماری SCF می‌باشد و نیتریک اکساید مشتق از اندوتیوم عروق یکی از فاکتورهای بیوشیمیای اصلی در تنظیم تونیسیته عروقی می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی غلظت سرمی نیتریک اکساید در بیماران SCF می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت موردی-شاهدی بوده و ۳۰ بیمار SCF ۳۵-۷۶ ساله ($53 \pm 11/83$ سال) و ۳۰ کنترل که از نظر سن ($51/37 \pm 11/89$ سال)، جنس و BMI با گروه بیماران SCF مطابقت داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از هر یک از افراد بیمار و کنترل ۳ سی سی نمونه خون وریدی در لوله‌های ژلدار جمع‌آوری گردید. اندازه‌گیری غلظت سرمی NO با استفاده از روش الیزا انجام گرفت.

یافته‌ها: میانگین مقادیر نیتریک اکساید در گروه کنترل $17/93 \pm 4/31 \mu\text{mol/L}$ SCF $18/04 \pm 7/99 \mu\text{mol/L}$ و در بیماران مبتلا به SCF $17/93 \pm 4/31 \mu\text{mol/L}$ بود و میانگین نیتریک اکساید در بیماران SCF نسبت به گروه کنترل تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نداد ($P=0/126$).

نتیجه‌گیری: با توجه به نقص عملکرد اندوتیال در پاتوژن سندروم جریان آهسته کرونری و همچنین نبود رابطه‌ی آماری معنی‌دار از نظر میانگین نیتریک اکساید بین گروه بیماران SCF و گروه کنترل در مطالعه حاضر، نیاز به بررسی نمونه‌ی بیشتر در این زمینه می‌باشد.

واژگان کلیدی: سندروم جریان آهسته کرونری، نیتریک اکساید، نقص عملکرد اندوتیال

مجله پژوهشی ارومیه، دوره بیست و هفتم، شماره سوم، ص ۲۱۵-۲۲۱، خرداد ۱۳۹۵

آدرس مکاتبه: ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی، تلفن: ۰۹۱۴۳۱۷۴۷۴۰

Email: rasmiy@umsu.ac.ir

مقدمه

که این وضعیت می‌تواند در یک یا همه عروق کرونری قلب وجود داشته باشد^(۱). اتیولوژی این بیماری ناشناخته است^(۵). مطالعات بافت‌شناسی، هایپرتروفی میوفیبرها، ضخیم‌شدن فیبرهای عضلانی کشسان عروق کوچک همراه با ورم و تجزیه سلول‌های اندوتیال و باریک‌شدن لومن عروق را در این بیماران نشان می‌دهد^(۶). ابزار تشخیص و ارزیابی بیماران SCF، آنژیوگرافی کرونری می‌باشد، که از TIMI بیشتر از ۲۳ و TIMI-2-flow که به ترتیب روش‌های

^۱ گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۲ مرکز تحقیقات سلوی و مولکولی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

^۳ گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۴ گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۵ گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۶ گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۱ slow coronary flow = SCF

تالیوم قلب آن‌ها مثبت بود، آنژیوگرافی توسط پزشک به عمل آمد و در صورت طبیعی بودن آنژیوگرام وجود معیارهای تشخیصی SCF-TIMI-2-flow SCF¹ یا SCF FrameCount² بیشتر از ۲۳ بیمار SCF محسوب می‌شد. از این بیماران که مورد تشخیص پزشک قرار گرفتند، فرم پرسشنامه اطلاعات و رضایت‌نامه برای هر یک پر شد. همچنین مطالعه حاضر، در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (کد کمیته اخلاق: IR.umsu.rec.1393.49) به تصویب رسیده است. معیارهای خروج از مطالعه شامل بیماری‌های عروق کرونری، پلاک کرونری، هرگونه انسداد عروق کرونری، گشادی عروق کرونری، سابقه سکته قلبی، نارسایی مزمن قلبی، نقص عملکردی بطן چپ، هایپرتروفی بطん چپ، فشارخون کنترل نشده، نارسایی کبدی و کلیوی، بیماری‌های عفونی حاد، بیماری‌های التهابی مزمن، وجود سندروم متابولیک، دیابت و مصرف داروهای ضد دیابت بود. نمونه‌گیری به صورت غیر تصادفی و سرشماری با استفاده از حذف نمونه‌های دارای معیار خروج انجام شد. از هر یک از افراد شرکت‌کننده ۳ سی‌سی نمونه خون وریدی در لوله‌های ۷‌لدار جمع‌آوری گردید و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد تا لخته شود و بعد با نیروی ۱۰۰۰g و به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شد و سرم آن جداسازی شده و در میکرو تیوب‌های ۱/۵ سی‌سی و در یخچال با دمای -۸۰ درجه سانتی‌گراد تا زمان انجام آزمایشات نگهداری شد.

سنجهای بیوشیمیایی:

اندازه‌گیری غلظت سرمی NO طبق پروتکل کیت اندازه‌گیری SPSS Biospes (Cat no. ByEK1198) و با استفاده از روش الیزا انجام گرفت و بعد از انجام مراحل آزمایش در دستگاه الیزا ریدر FAX-2100 میزان جذب نمونه‌ها در طول موج ۴۵۰nm قرائت شد و بعد میزان جذب نمونه‌ها با استفاده از نمودار استاندارد تبدیل به غلظت بر حسب میکرو مول در لیتر شد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها:

داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای متغیرهای کیفی مانند جنس، سیگاری بودن و سابقه فامیلی بیماری قلبی از درصد و برای متغیرهای کمی از قبلی Chi-square و داده‌های کمی با استفاده از آزمون Mann-Whitney t-test (independent t-test) از آزمون تی (Chi-square) و داده‌های کمی با استفاده از آزمون Mann-Whitney t-test (independent t-test) از آزمون تی (Chi-square) و داده‌های کمی با استفاده از آزمون Chi-square و داده‌های کمی با استفاده از آزمون Mann-Whitney t-test (independent t-test) از آزمون تی (Chi-square) و داده‌های کمی با استفاده از آزمون Mann-Whitney t-test (independent t-test) از آزمون T به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

ارزیابی کمی و کیفی جریان خون کرونری می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد(۷).

مقالات و گزارشات آنژیوگرافی نشان می‌دهد که حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد بیمارانی که تحت آنژیوگرافی بوده‌اند، وضعیت نرمال یا نزدیک به نرمال را نشان داده‌اند(۸) که ۱-۷ درصد از موارد آنژیوگرافی را SCF به خود اختصاص می‌دهد(۹، ۱۰). ۴ درصد بیماران دارای درد سینه ناپایدار، مربوط به بیماران SCF است(۱۰). شیوع SCF در مردان جوان و افراد سیگاری بالاتر است(۱۱). این بیماران از درد سینه عودکننده، بستری مکرر در بیمارستان و تکرار کاتتریزاسیون قلبی رنج می‌برند(۲). از همه مهم‌تر، آریتمی‌های تهدیدکننده زندگی و مرگ ناگهانی قلبی در این بیماران گزارش شده است(۳). همچنین SCF می‌تواند به ایسکمی میوکاردی و سندروم کرونری حاد منجر شود(۱۲). اگرچه مطالعات متعدد در چندین دهه گذشته انجام شده است اما مکانیسم مشخص برای SCF ناشناخته باقی مانده است(۱-۳). نقص عملکرد اندوتیال که از علل اصلی سندروم SCF شناخته می‌شود(۱۳) با کاهش گوانوزین منوفسفات حلقوی که به عنوان پیامبر دوم نیتریک اکساید است، مشخص می‌گردد(۱۴). همچنین داده‌های به دست آمده نشان می‌دهند که نیتریک اکساید به عنوان گشادکننده عروقی که از سلول‌های اندوتیال تولید می‌شود، نقش مهمی در پاتولوژی بیماری دارد(۱۵). نقص عملکرد اندوتیال، مخصوصاً کاهش NO مشتق از اندوتیلیوم، یک رخداد زودرس آترواسکلروزیس می‌باشد که زودتر از تغییرات ساختاری آترواسکلروزیک ظاهر می‌گردد(۱۶، ۱۷). سه ایزوژنیم نیتریک اکسایدستنتر (eNOS) در بدن از L-آرژنین، تولید NO می‌کنند(۱۸). نیتریک اکساید سنتاز اندوتیالی (NOS-III) ایزوفرم اصلی تنظیم‌کننده عملکرد عروقی است(۱۹). با توجه اینکه نقص عملکرد اندوتیال یکی از عوامل اصلی اتیولوژی بیماری SCF می‌باشد و نیتریک اکساید مشتق از اندوتیلیوم عروق یکی از فاکتورهای بیوشیمیایی اصلی در تنظیم تونیسیته عروقی بوده و هرگونه نقصی در تولید آن منجر به نقص عملکرد اندوتیال می‌شود، در این مطالعه غلظت سرمی نیتریک اکساید در بیماران SCF موردنبررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت موردی-شاهدی بوده و ۳۰ بیمار ۷۶SCF-۳۵ ساله ($53 \pm 11/83$ سال) و ۳۰ کنترل که از نظر سن ($51/37 \pm 11/89$ سال)، جنس و BMI با گروه مورد مطابقت داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نحوه انتخاب بیماران SCF به این صورت بود که از افراد مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا ارومیه که دارای درد قفسه سینه بوده و تست ورزش و یا اسکن

میلی‌متر جیوه به ترتیب در گروه کنترل و بیماران مبتلا به SCF دارای تفاوت آماری معنی‌داری می‌باشند ($P < 0.05$).

مشخصات دموگرافیک شامل سن، جنس، BMI، فشارخون سیستولی و دیاستولی، ضربان قلب، سابقه بیماری‌های قلبی و مصرف سیگار در جدول یک نشان داده شده است. فشارخون سیستولی با میانگین $128/80 \pm 15/85$ و $137/84 \pm 13/79$ میانگین (مرد/زن)

جدول (۱): مشخصات دموگرافیک در گروه کنترل و بیماران سندروم جریان آهسته کرونری

P-value	بیماران SCF	کنترل	متغیر
.۰/۵۹۶	$53 \pm 11/83$	$51/36 \pm 11/89$	سن (سال)
۱	۸/۲۲	۸/۲۲	جنسیت (مرد/زن)
.۰/۶۲۶	$26/93 \pm 4/46$	$27/44 \pm 3/60$	شاخص توده بدن (kg/m ²)
.۰/۰۰۵	$128/03 \pm 15/85$	$137/48 \pm 13/79$	فشارخون سیستولی (mmHg)
.۰/۰۰۲	$78/53 \pm 13/11$	$88/72 \pm 10/31$	فشارخون دیاستولی (mmHg)
.۰/۱۰۴	$74/16 \pm 7/69$	$78/12 \pm 10/03$	ضربان قلب (n)
-	۶۰.۷۱	-	مصرف سیگار (%)
-	۲۶.۶۶	-	سابقه فامیلی بیماری‌های قلبی(%)

میانگین مقادیر نیتریک اکساید در گروه کنترل $18/04 \pm 7/99$ و در بیماران مبتلا به SCF $17/93 \pm 4/31$ میکرو مول بر لیتر بود (جدول ۲).

جدول (۲): مقایسه میانگین نیتریک اکساید در گروه کنترل و بیماران سندروم جریان آهسته کرونری (SCF)

P-value	بیماران SCF	کنترل	متغیر
.۰/۱۲۹	$17/93 \pm 4/31$	$18/04 \pm 7/99$	نیتریک اکساید ($\mu\text{mol/L}$)

(۳۶/۶۶ درصد) با یک شریان کرونری درگیر (یک نفر (۳/۳۳ درصد) با درگیری شریان کرونری RCA و ۱۰ نفر (۳۳/۳۳ درصد) با درگیری شریان کرونری LAD بودند. میانگین مقادیر نیتریک اکساید در گروه بیماران با سه شریان کرونری درگیر $\mu\text{mol/L} ۱۹/۲۴ \pm 6/11$ و در گروه بیماران با کمتر از ۳ شریان کرونری درگیر $16/93 \pm 1/79 \mu\text{mol/L}$ بود ولی با توجه به جدول شماره ۳ هیچ تفاوت آماری معنی‌داری بین این دو گروه و همچنین بین هر یک از این دو گروه با گروه کنترل مشاهده نشد.

بیماران مبتلا به SCF در این مطالعه بر اساس مقدار LCX.RCA.LAD به دو گروه بیماران با سه شریان کرونری درگیر و کمتر از ۳ شریان کرونری درگیر تقسیم شدند که توزیع این بیماران در این دو گروه به این صورت بوده است که ۱۳ نفر (۴۳.۳٪) با سه شریان کرونری درگیر، ۶ نفر (۲۰٪) با دو شریان کرونری درگیر (۲ نفر (۶.۶٪) با درگیری عروق LCX و LAD و ۴ نفر (۱۳٪) با درگیری عروق RCA و LAD) و ۱۱ نفر

جدول (۳): مقایسه میانگین نیتریک اکساید در گروه بیماران مبتلا به SCF با سه شریان کرونری درگیر و گروه کنترل

P-value	P-value	P-value	بیماران SCF با کمتر از سه رگ درگیر	بیماران SCF با سه رگ درگیر	کنترل	متغیر
***	**	*				نیتریک اکساید

*مقایسه گروه کنترل و زیرگروه بیماران سندروم جریان آهسته کرونری با سه رگ درگیر

*** مقایسه گروه کنترل با زیرگروه بیماران با سندروم جریان آهسته کرونری با سه رگ درگیر

*** مقایسه زیرگروه‌های بیماران سندروم جریان آهسته کرونری با سه رگ درگیر و کمتر از سه درگیر

تنگ‌کننده و گشادکننده عروقی^(۵) و ناهنجاری عملکرد پلاکت می‌باشد^(۵)، که مطالعات نشان داده‌اند که علت اصلی این بیماری نقص عملکرد اندوتیال و نقص عملکرد میکروواسکولار است^(۱۳). NO مشتق از اندوتیلیوم در گشادی عروق، افزایش جریان خون، کاهش فشارخون، مهار تجمع و چسبندگی پلاکت، مهار چسبندگی لکوسیت و کاهش پرولیفراسیون عضله صاف نقش دارد و از به وجود آمدن آتروواسکلروزیس ممانعت می‌کند^(۲۴، ۲۳) که تمامی این عامل را با تحریک گوانیلات سیکلаз محلول در سلول‌های عضله صاف عروقی برای تولید GMP به انجام می‌رساند^(۲۵). عملکرد NO مشتق از اندوتیال، در تنظیم جریان خون کرونری با مهار انقباض عضله صاف و تجمع پلاکت می‌باشد^(۲۶). در مطالعه‌ای که Sezgin و همکارانش در سال ۲۰۰۵ و باهدف بررسی غلظت پلاسمایی نیتریک اکساید و نقش آن در بیماران SCF انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کاهش فعالیت NO به عنوان یک واژودیلاتور مشتق از اندوتیلیوم در این بیماران مطرح می‌نماید و NO اندوتیال را به عنوان اتیولوژی در این بیماران مطرح می‌نماید و در این مطالعه دارای همبستگی منفی با Framecount TIMI در سه شریان کرونری RCA، LAD و LCX بود^(۱۵). همچنین در مطالعه‌ی دیگری که توسط Camsari و همکارانش انجام شد نیز گزارش کردند که غلظت نیتریک اکساید در بیماران SCF نسبت به افراد سالم کاهش معنی‌داری را نشان داد و به این نتیجه رسیدند که عملکرد اندوتیال که با اندازه‌گیری نیتریک اکساید موردنیجش قرار گرفت، در این بیماران غیر نرمال می‌باشد و می‌تواند از عوامل مؤثر در پاتوفیزیولوژی SCF باشد^(۲۷). در مطالعه حاضر با توجه به اینکه کاهش NO در بیماران SCF معنی‌دار نیست و همچنین برخلاف نتایج مطالعه Sezgin و همکارانش، NO در این مطالعه دارای همبستگی مثبت با Framecount TIMI در سه شریان کرونری RCA، LAD و LCX بود، بنابراین پیشنهاد می‌گردد که تعداد بیماران بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

تقدیر و تشکر

این مطالعه برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی می‌باشد و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مورد حمایت قرار گرفته است. از تمامی افرادی که در به انجام رسیدن این مطالعه همکاری داشتند، کمال تشکر را دارم.

References:

میانگین Framecount TIMI در سه شریان کرونری RCA و LAD و LCX به ترتیب $43/51 \pm 8/52$ و $36/33 \pm 8/42$ بود که نتایج بررسی ارتباط و همبستگی بین شریان‌های کرونری با NO در بیماران مبتلا به SCF نشان داد که NO با TIMIFramecount در شریان LAD ($P=0/0.35$) و کرونری LCX ($P=0/0.11$) ($t=0/634$) دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار بود. همچنین در بررسی ارتباط و همبستگی متغیرهای دموگرافیک و NO نشان داده شد که NO با فشارخون سیستولی ($P=0/251$)، ضربان قلب ($P=0/245$)، BMI ($P=0/441$) و ($P=0/0.55$) ($t=0/105$) دارای همبستگی منفی و با سن ($P=0/0.52$) ($t=0/0.07$) همبستگی مثبت دارد ولی هیچ ارتباط معنی‌داری میان NO و فاکتورهای دموگرافیک مشاهده نشد.

بحث و نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان داد که از نظر غلظت سرمی نیتریک اکساید بین گروه بیماران مبتلا به SCF (کل بیماران، بیماران مبتلا به SCF با سه شریان کرونری درگیر و بیماران مبتلا به SCF با کمتر از سه شریان کرونری درگیر) نسبت به گروه کنترل و همچنین بین بیماران مبتلا به SCF با سه شریان کرونری درگیر با بیماران مبتلا به SCF با کمتر از سه شریان کرونری درگیر تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت. همچنین از لحاظ فشارخون سیستولی و فشارخون دیاستولی، ارتباط معنی‌داری بین دو گروه مشاهده گردید ($P<0.05$).

بیماران با ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی از قبیل پرفشاری خون، هیپرکلسترولمی، دیابت ملیتوس، مصرف سیگار و بیماران با بیماری‌های عروقی، دارای نقص عملکرد اندوتیال هستند که ناشی از ناتوانی اندوتیلیوم در تولید کافی NO می‌باشد^(۲۰). تاکنون مطالعات زیادی در مورد اتیولوژی بیماری SCF انجام شده است. چندین فرضیه در مورد مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیکی این بیماری وجود دارد^(۵) که شامل، فرم زودرس بیماری آتروواسکلروزیس قلبی^(۵)، نقص عملکرد اندوتیال^(۲۱)، انسداد عروق کوچک^(۶)، افزایش مقاومت میکروواسکولار^(۲۲)، نقص عملکرد میکروواسکولار^(۵)، التهاب^(۵)، عدم تعادل بین فاکتورهای

1. Tambe AA, Demany MA, Zimmerman HA, Mascarenhas E. Angina pectoris and slow flow

- velocity of dye in coronary arteries--a new angiographic finding. *Am Heart J* 1972;84(1): 66-71.
2. Beltrame JF, Limaye SB, Wuttke RD, Horowitz JD. Coronary hemodynamic and metabolic studies of the coronary slow flow phenomenon. *Am Heart J* 2003;146(1): 84-90.
 3. Li JJ, Xu B, Li ZC, Qian J, Wei BQ. Is slow coronary flow associated with inflammation? *Med Hypotheses* 2006;66(3): 504-8.
 4. Wozakowska-Kaplon B, Niedziela J, Krzyzak P, Stec S. Clinical manifestations of slow coronary flow from acute coronary syndrome to serious arrhythmias. *Cardiol J* 2009;16(5): 462-8.
 5. Habil U Y, Abdullah D, Yasin T, Atilla İ, Salaheddin A, İbrahim E, et al. Lack of Association between the Glu298Asp Polymorphism of Endothelial Nitric Oxide Synthase and Slow Coronary Flow. *J Am Coll Cardiol* 2013;62(18_S2): 54-5.
 6. Mosseri M, Yarom R, Gotsman MS, Hasin Y. Histologic evidence for small-vessel coronary artery disease in patients with angina pectoris and patent large coronary arteries. *Circulation* 1986;74(5): 964-72.
 7. Gori T, Fineschi M. Two coronary "orphan" diseases in search of clinical consideration: coronary syndromes x and y. *Cardiovasc Ther* 2012;30(2):e58-65.
 8. Crea F, Lanza GA. Angina pectoris and normal coronary arteries: cardiac syndrome X. *Heart* 2004;90(4): 457-63.
 9. Singh S, Kothari S, Bahl V. Coronary slow flow phenomenon: an angiographic curiosity. *Indian Heart J* 2004;56(6): 613-7.
 10. Diver DJ, Bier JD, Ferreira PE, Sharaf BL, McCabe C, Thompson B, et al. Clinical and arteriographic characterization of patients with unstable angina without critical coronary arterial narrowing (from the TIMI-IIIa Trial). *Am J Cardio* 1994;74(6): 531-7.
 11. Beltrame JF, Limaye SB, Horowitz JD. The coronary slow flow phenomenon—a new coronary microvascular disorder. *Cardiology* 2002;97(4): 197-202.
 12. Cutri N, Zeitz C, Kucia AM, Beltrame JF. ST/T wave changes during acute coronary syndrome presentation in patients with the coronary slow flow phenomenon. *Int J Cardiol* 2011;146(3): 457-8.
 13. Yilmaz H, Demir I, Uyar Z. Clinical and coronary angiographic characteristics of patients with coronary slow flow. *Acta Cardiol* 2008;63(5): 579-84.
 14. Lerman A, Holmes DR Jr, Bell MR, Garratt KN, Nishimura RA, Burnett JC Jr. Endothelin in coronary endothelial dysfunction and early atherosclerosis in humans. *Circulation* 1995; 92: 2426-31.
 15. Sezgin N, Barutcu I, Sezgin AT, Gullu H, Turkmen M, Esen AM, et al. Plasma nitric oxide level and its role in slow coronary flow phenomenon. *Int Heart J* 2005;46(3): 373-82.
 16. Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM, Spiegelhalter DJ, Miller OI, Sullivan ID, et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. *Lancet* 1992;340(8828):1111-5.
 17. Diaz MN, Frei B, Vita JA, Keaney JF Jr. Antioxidants and atherosclerotic heart disease. *N Eng J Med* 1997;337: 408-16.
 18. Moncada S, Higgs A. The L-arginine-nitric oxide pathway. *N Engl J Med* 1993;329(27):2002-12.
 19. Förstermann U, Münzel T. Endothelial nitric oxide synthase in vascular disease from marvel to menace. *Circulation* 2006;113(13): 1708-14.
 20. Mueller CF, Laude K, McNally JS, Harrison DG. Redox mechanisms in blood vessels. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2005;25: 274-8.

21. Sezgin AT, Sigirci A, Barutcu I, Topal E, Sezgin N, Ozdemir R, et al. Vascular endothelial function in patients with slow coronary flow. Coron Artery Dis 2003;14(2): 155-61.
22. Erdogan D, Caliskan M, Gullu H, Sezgin AT, Yildirir A, Muderrisoglu H. Coronary flow reserve is impaired in patients with slow coronary flow. Atherosclerosis 2007;191(1): 168-74.
23. Toda N, Okamura T. The pharmacology of nitric oxide in the peripheral nervous system of blood vessels. Pharmacol Rev 2003;55(2):271-324.
24. Toda N, Okamura T. Possible role of nitric oxide in transmitting information from vasodilator nerve to cerebroarterial muscle. Biochem Biophys Res Commun 1990;170(1):308-13.
25. Denninger JW, Marletta MA. Guanylate cyclase and the .NO/cGMP signaling pathway. Biochim Biophys Acta 1999;1411(2-3):334-50.
26. Toda N, Tanabe S, Nakanishi S. Nitric oxide-mediated coronary flow regulation in patients with coronary artery disease: recent advances. Int J Angiol 2011;20(3):121-34.
27. Camsarl A, Pekdemir H, Cicek D, Polat G, Akkus MN, Döven O, et al. Endothelin-1 and nitric oxide concentrations and their response to exercise in patients with slow coronary flow. Circ J 2003;67(12):1022-8.

SERUM LEVELS oF NITRIC OXIDE iN SLOW CORONARY FLOW PHENOMENON

*Mohadeseh Nemati¹, Yousef Rasmi^{*2}, Mohammad-Hassan Khadem-Ansari³, Sanaz Faramarz-Gaznagh⁴, Mir-Hossein Seyed-Mohammadzad⁵, Narmin Mokarizadeh⁶*

Received: 20 Feb, 2016; Accepted: 28 Apr, 2016

Abstract

Background & Aims: Coronary slow flow phenomenon (SCF) is normal or near-normal angiographically that is known with delayed passage of contrast in coronary arteries. Etiology of SCF is unknown. Endothelial dysfunction is one of the main factors in the etiology of SCF and vascular endothelium-derived nitric oxide is one of the main biochemical factors in the regulation of vascular tonicity. The aim of this study was to evaluate serum levels of nitric oxide metabolites in SCF patients.

Materials and Methods: Thirty patients with SCF (53 ± 11.83 years) and 30 healthy controls (51.37 ± 11.89 years) were entered in the case-control investigation. Cases and controls were matched for age, gender, and body mass index. Three ml of blood samples were collected in tubes. Serum concentrations of NO metabolites were measured by ELISA method (Ltd. Co, China).

Results: The mean values of nitric oxide metabolites in controls and patients with SCF was 18.04 ± 7.99 and $17.93 \pm 4.31 \mu\text{mol/L}$, respectively; $P=0.129$.

Conclusion: Endothelial dysfunction is the main factor in the pathogenesis of SCF. But in this study, serum levels of nitric oxide metabolites were not statistically significant in patients with SCF patients versus controls. So it was recommended to further investigate with more subjects.

Key words: Coronary slow flow, Nitric oxide, Endothelial dysfunction, Angiography

Address: Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Tel: +984432770698

E-mail: rasmiy@umsu.ac.ir

SOURCE: URMIA MED J 2016; 27(3): 221 ISSN: 1027-3727

¹ Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

² Cellular and Molecular Research Center, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

³ Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

⁴ Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

⁵ Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

⁶ Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran