

ویر توپسی، مکملی برای اتوپسی

لادن سلطانزاده^۱، دکتر مهرداد ایمانزاده^۲، دکتر حمید کشوری^{۳*}

تاریخ دریافت ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ تاریخ پذیرش ۱۳۹۲/۰۱/۲۰

چکیده

مقدمه: کالبد شکافی به عنوان یکی از روش‌های ارزشمند پزشکی به رسمیت شناخته شده است. تعدادی از تکنیک‌های رادیولوژی دیجیتال، از جمله MRI دارای پتانسیل لازم برای تغییر کالبد شکافی سنتی و بهبود قابلیت اطمینان از نتایج می‌باشد. کالبد شکافی مجازی یک روش غیرتهاجمی بدون آسیب به بافت است. کالبدشکافی غیرتهاجمی مجازی در برخی موارد، می‌تواند جایگزین کالبدشکافی سنتی تهاجمی شود. استفاده از ابزار تصویربرداری و سیستم (PACS) را می‌توان از ابزارهای مفید در تحقیقات پزشکی قانونی در نظر گرفت. هدف از این مطالعه "آشنایی با Virtopsy" است.

مواد و روش‌ها: مطالعه مروری نظالممند حاضر با استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی و معادل فارسی مرتبط با "کالبدشکافی مجازی"، "کاربرد سیستم‌های تصویربرداری"، "پزشکی قانونی" و "تکنیک‌ها" و "تجهیزات" و "PACS" به منظور جستجوی مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی Proquest، Pubmed، Google Scholar، Elsevier، Magiran و SID از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، صورت پذیرفته است. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: مقالات به زبان انگلیسی یا فارسی باشند. کلید واژه‌های "کالبد شکافی مجازی"، "فن‌آوری‌های تصویربرداری"، "پزشکی قانونی" و "تکنیک" و "PACS". در عنوان، متن و کلمات کلیدی مقالات موجود باشند و مقالات در مجلات دارای ISI به چاپ رسیده و به صورت Peer Review مورد بررسی و داوری قرار گرفته باشند تا از اعتبار علمی برخوردار باشند. در بررسی با توجه به این معیارها و حذف مقالاتی که به صورت چکیده یا برداشت سردیر بودند، از ۳۲۵ مقاله مرتبط یافت شده تنها ۸۳ مقاله مورد بررسی قرار می‌گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که نرخ کالبد شکافی پزشکی در سراسر جهان در حال کاهش است. تکنیک‌های جدید تصویربرداری رادیولوژی پتانسیل برای تبدیل کالبد شکافی سنتی را دارند. طبیعت کالبدشکافی مجازی باعث مقیولیت کالبدشکافی در مواردی که داغده‌های مذهبی و یا اخلاقی به وجود می‌آیند می‌شود. یافته‌های کالبد شکافی مجازی با استفاده سیستم PACS می‌تواند با استفاده از رادیولوژی از راه دور به بررسی و تشخیص بپردازد.

نتیجه گیری: مطالعات نشان می‌دهد که یافته‌های مشخص شده در طی کالبد شکافی فیزیکی اغلب سؤالاتی را ایجاد می‌کنند که فقط با کالبد شکافی مجازی پاسخ داده می‌شوند. در برخی از کشورها، برای کالبدشکافی پزشکی قانونی از کالبد شکافی مجازی استفاده می‌شود و مشاهدات ما نشان می‌دهد که کالبد شکافی مجازی یک ابزار ارزشمند برای مستندسازی یافته‌های پاتولوژیک است.

کلمات کلیدی: کالبد شکافی مجازی، فن‌آوری‌های تصویربرداری، پزشکی قانونی، تکنیک، PACS

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و چهارم، شماره چهارم، ص ۲۶۳-۲۷۶، تیر ۱۳۹۲

آدرس مکاتبه: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پایی تکنیک تهران)، گروه مهندسی پزشکی، ۰۲۱-۶۴۵۴۲۴۸۱ تلفن: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۴۸۱

Email: Keshvari@aut.ac.ir

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۲ مدرس گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

^۳ دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نویسنده مسئول)

مقدمه**کالبدشکافی^۱:**

برش دادن و جدا کردن بافت‌های بدن برای مطالعه را کالبدشکافی می‌نامند^(۳).

کالبدشکافی به روش سنتی:

کالبد شکافی تهاجمی به صورت "بدن باز" یک روش سنتی پس از مرگ جهت تحقیق و تفحص در بدن انسان است. نوع و محل برش‌ها نیاز به تبحر خاصی دارد تا اندامها و عضلات به خوبی نمایش داده شوند^{(۴)، (۳)}. کالبدشکافی از قرن‌ها پیش برای مقاصد مختلف در کشورهای مختلف انجام می‌شد، مثلاً در مصر و بین‌النهرین برای مومنیابی اجساد، در هند و یونان برای شناخت آناتومی اندامها و بیماری‌ها انجام می‌شد^(۵).

مطالعات کالبدشکافی از قرن هفدهم رونق یافت و در قرن نوزدهم توسط Osler در جهت آموزش بالینی مرسوم شد و دانشجویان انجام آموزش اتوپسی را بخشنی از تحصیل خود پذیرفتند^(۶). در حال حاضر، کالبدشکافی اغلب در سالن تشريح بخش‌های آناتومی دانشگاه‌ها یا در پزشکی قانونی برای بررسی علت مرگ انجام می‌گیرد. کالبد شکافی یک ابزار ضروری برای آموزش دانشجویان و رزیدنت‌های پاتولوژی و در عین حال، مقیاسی جهت ارزیابی عملکرد هر بیمارستان است^(۶). کالبد شکافی می‌تواند عاقبت اقتصادی و قانونی بسیار مهمی برای بیمارستان‌ها و پزشکان به همراه داشته باشد^(۷).

علاوه بر مقاصد آموزشی در دانشگاه‌ها، کالبدشکافی به دو علت قضایی^(۸) و تشخیصی^(۹) انجام می‌شود. نوع قضایی به دستور مقام قضایی و بنابر شکایت اولیای دم متوفی توسط پزشکی قانونی صورت می‌گیرد تا معلوم گردد که آیا متوفی در اثر بیماری یا سانحه فوت شده و یا به قتل رسیده است. نتایج حاصله از این نوع اتوپسی به صورت محکمه پسند بوده به بررسی دقیق بیماری‌های جسد نمی‌بردازد^(۸). بر عکس در کالبدشکافی تشخیصی که توسط پاتولوژیست صورت می‌گیرد هدف کشف بیماری مسبب مرگ متوفی است تا موجب آرامش خاطر بازماندگان شده نگرانی ایشان از بابت کوتاهی‌های بالقوه خودشان یا کادر پزشکی رفع گردد^(۹). در اروپا، نزد کالبد شکافی رو به کاهش است^(۱۰-۱۳) در ایالات متحده آمریکا، استرالیا و آسیا، روند یکسان هستند^(۱۴-۱۶) روش کالبدشکافی استفاده شده توسط گروه آسیب شناسی در سراسر جهان در طول قرن گذشته تغییر نکرده است. در واقع، آسیب‌شناسان بر مورفولوژی اندام‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی تکیه می‌کنند^(۱۷).

کاهش تمایل به کالبدشکافی سنتی:
استفاده از کالبدشکافی تهاجمی و سنتی رو به کاهش است^(۱۸). در کاهش تمایل به کالبدشکافی به شیوه سنتی عواملی موثر هستند.

عوامل عاطفی، فرهنگی و مذهبی حاکم بر جوامع از عوامل موثر در عدم تمایل جوامع به کالبدشکافی به شیوه سنتی می‌باشد، ضمناً نیاز به رضایت نامه و راث و فقدان آموزش در خصوص مزایای کالبدشکافی نیز در نگرش مردم به کالبدشکافی موثر است^{(۲۲)، (۲۱)، (۱۸)}. فرآیند کسالت‌آور کسب رضایت‌نامه از وراست، مخالفت خانواده داغ‌دیده با کالبدشکافی در کنار پیشرفت تکنیک‌های تشخیص علت مرگ نیز مانع تمایل پزشکان بالینی به کالبد شکافی سنتی می‌باشد^{(۲۲)، (۱۹)}. علاوه بر این کالبدشکافی در برخی دپارتمان‌های پاتولوژی از جایگاه پایین‌ترین برخوردار است^(۲۰) تأخیر، گزارش‌های نامتناقض و ناقص، ناخوشایند بودن، گران و وقت‌گیر بودن فرآیند کالبدشکافی نیز و خطر انتقال پاتوژن‌های خونی نظیر HIV+ و هپاتیت C (ییشترا در قدیم) از عوامل عدم تمایل پاتولوژیست‌ها به کالبدشکافی می‌باشد^{(۲۲)، (۲۱)}.

ضمناً پیشرفت تکنیک‌های تشخیصی و تصویربرداری زمینه‌های آموزش مناسب را برای دانشجویان فراهم می‌نماید.

عوامل موثر در اجرای کالبدشکافی عبارتند از:

- میزان درخواست توسط پزشکان
- قوانین تعیین رضایت کالبد شکافی قانونی
- میزان رضایت^(۲۲)

روش کار

مطالعه مروری نظاممند حاضر با استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی و معادل فارسی مرتبط با "کالبدشکافی مجازی"، "کاربرد سیستم‌های تصویربرداری"، "پزشکی قانونی" و "تکنیک‌ها" و "تجهیزات" و "PACS" به منظور جستجوی مقالات در پایگاه‌های Google، Science Direct، Proquest، Pubmed، Elsevier، Magiran و Schoolar اساس معیارهای ورود به مطالعه، صورت پذیرفته است. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از:

مقالات به زبان انگلیسی یا فارسی باشند.
کلید واژه‌های "کالبدشکافی مجازی"، "کاربرد سیستم‌های تصویربرداری"، "پزشکی قانونی" و "تکنیک‌ها" و "تجهیزات" و "PACS" در عنوان، متن و کلمات کلیدی مقالات موجود باشند.
مقالات در مجلات دارای ISI به چاپ رسیده و به صورت Peer Review مورد بررسی و داوری قرار گرفته باشند تا از اعتبار علمی

^۱ Autopsy

مجازی که حدود ۳۰ دقیقه طول می‌کشد (۲۴). جسد روی سطحی قرار داده می‌شود و اسکنرهای سه بعدی اطلاعات آن را ثبت می‌کنند سپس این اطلاعات پس از آن به شکل رایانه‌ای ارزیابی می‌شود. سیستم ویرتوپسی با بهره‌گیری از یک پرتونگاری مقطعي (توموگرافی) کامپیوتراً یا سی تی اسکن به همراه تصویربرداری ام آر آی با شدید مغناطیسی یک نمای تفصیلی از بدن بدست می‌آورد (۲۴-۲۶). پزشکی قانونی و پاتولوژیست از تصاویر ام آر آی و ترکیب اشعه X برای ایجاد نمای سه بعدی کامل از بدن برای بررسی وضعیت از رگ‌های خونی، اندام‌ها، استخوان‌ها و بافت‌های بدن استفاده می‌کنند که می‌تواند در تعیین نتیجه علت مرگ و شیوه‌ای که در آن بیمار فوت کرده است بکار رود.

کالبد شکافی مجازی حتی می‌تواند برخی از اطلاعات حیاتی در مورد بدن که به دست آوردن آن با استفاده از ابزار معمولی مشکل و یا وقت‌گیر است، روش‌شون کند. با این روش تصاویری از شکستگی‌های استخوانی، آسیب‌های مغزی و حتی تصاویری از بافت‌های نرم بدن و رگ‌های خونی فراهم می‌شود (۲۴-۲۶). در این روش، جسد روی سطحی قرار می‌گیرد و با استفاده از ابزارهای تصویربرداری رادیولوژی از قبیل سی تی اسکن، ام آر آی و آنژیوگرافی و با استفاده از سیستم‌های نرم افزاری براساس دانسته بافت‌ها شفافیت آن‌ها و سایر معیارها فیلتر انجام می‌شود، اطلاعات لازم در سیستم کامپیوتراً ذخیره می‌شود و سپس این اطلاعات توسط نرم افزار ویژه‌ای ارزیابی می‌شود، سپس بازسازی تصاویر اتوپسی صورت می‌گیرد و نتایج در اختیار محققان پزشکی قانونی قرار می‌دهند (۲۴-۲۷). که این فرایند منجر به بهبود کیفی در تحقیقات پاتولوژی پزشکی قانونی می‌شود. تکنیک‌های پس پردازش مختلف می‌تواند شواهد پزشکی قانونی قوی را برای استفاده در روند مراحل قانونی ارائه نماید.

Virtobot


در انسٹیتوی پزشکی قانونی دانشگاه برن رویوتی به نام virtobot ابداع شده است که اتوپسی (کالبد شکافی) مجازی انجام می‌دهد. روبوت حدود و بافت بدن مرده را با تابش ستون‌های نور و گرفتن عکس‌های با کیفیت بالا اسکن می‌کند. در همان اتاق تصاویری توسط CT scan نیز از بدن مرده تهیه می‌شود. سپس از ترکیب اطلاعات فوق تصاویر سه بعدی تهیه می‌گردد که می‌توان آن‌ها را به مدت طولانی نگهداری کرد و در آزمایشات پزشکی قانونی استفاده نمود. علاوه بر این روبوت قادر است تحت هدایت CT نمونه برداری نیز انجام دهد. در واقع، Virtobot یک یونیت تحقیقاتی که کلیه تکنولوژی‌های اتوپسی را به هم ملحق می‌نماید (۲۸، ۲۹).

برخوردار باشند. در بررسی با توجه به این معیارها و حذف مقاطلاتی که به صورت چکیده یا برداشت سردبیر بودند، از ۳۲۵ مقاله مرتبط یافت شده تنها ۸۳ مقاله مورد بررسی قرار می‌گرفت.

یافته‌ها

کالبد شکافی مجازی^۱

یک روش غیرتهاجمی در انجام کالبد شکافی انسان است که بدون آسیب رسیدن به بافت‌های بدن، بررسی و تشخیص صورت می‌گیرد. این روش در سال‌های اخیر عنوان مکمل به کالبد شکافی متعارف بکار می‌رود. این شامل انواع تکنیک‌های مدرن تصویربرداری پزشکی با تعدادی برنامه کاربردی ویژه در پزشکی قانونی است (۲۳).



پروژه ویرتوپسی^۲:

اصطلاح Virtual autopsy از واژه‌های VIRTOPSY از واژه‌های virtual و autopsy تشکیل شده است. از کلمه لاتین 'Virtus'، که به معنی مفید، کارآمد و خوب می‌باشد مشتق شده است. Autopsy از واژه قدیم یونانی 'autos'، به معنی "خود" و 'Opsomei'، به معنی "می‌بینم" تشکیل شده است. بنابراین Autopsy "دیدن با چشم‌های خود" معنی می‌دهد. مایکل تالی استاد دانشگاه برن و همکارانش سیستمی را با نام "ویرتوپسی" یا کالبد شکافی مجازی "بداع کرده‌اند، که به کمک آن می‌توان بدون شکافتن جسد، علت مرگ آن را مشخص کرد (۲).

این روش از سال ۲۰۰۶ برای کشف علت همه مرگ‌های ناگهانی در پایتخت سوئیس استفاده شده است. که در آن بدون شکافتن جسد می‌توانند ۶۰ تا ۸۰ درصد جراحات یا علل مرگ را شناسایی کنند (۲۳، ۲۴). مزایای کالبد شکافی مجازی این است که اطلاعات آن به طور دیجیتالی و دائمی ثبت می‌شود، و امكان تبادل و انتشار آن از طریق اینترنت وجود دارد. کالبد شکافی

¹ Virtual Autopsy

² Virtopsy

Virtobot



- کنترل دندان‌ها و انگشت نگاری
 - مالتی CT & MRI
 - ماشین قلب ریه و آنژیوگرافی سی تی اسکن
 - بازوی رباتیک هدایت کننده تصویر برداری اتوپسی و بیوبسی
 - هیستوپاتولوژی و سیتولوژی
 - مطالعات سم شناسی، بیوشیمیابی و مولکولی
 - ضمناً، از مالتی سی تی اسکن و ام آر ای در تشخیص موارد زیر استفاده می‌شود:
 - شکستگی‌های شدید
 - پوسیدگی
 - مسیر گلوله
 - جراحت‌های عروقی
 - غرق شدگی
 - خون لخته
 - جسم خارجی
 - مغز و ریه
 - مستند سازی آسیب
 - برنامه ریزی کالبد شکافی
 - اتوپسی محدود (۲۴-۲۸)
- ^{۱۲} کاربرد PACS در کالبد شکافی مجازی
- ^{۱۳} سرویس ارتباطات و آرشیو تصاویر وظیفه گرفتن تصاویر، بایگانی تصاویر، انتقال تصاویر، بازسازی تصاویر و نمایش و پردازش

^{۱۲} Virtual Autopsy^{۱۳} Picture Archiving & Communication Service (PACS)تجهیزات مورد استفاده در کالبد شکافی مجازی^۱تجهیزات ضروری ویرتوپسی^۲ عبارتند از:

۱. انواع دستگاه توموگرافی کامپیوتربی یا سی تی اسکن (میکرو سی تی اسکن^۳ و سی تی اسکن مولتی اسلایس^۴ (۲۴-۲۹))
۲. دستگاه ام آر آی^۵ و دستگاه ام آر آی میکروسوبی^۶
۳. دستگاه اسپکتروسکوپی با جذب اتمی^۷
۴. دستگاه فتوگرامتری CAD سه بعدی^۸ (۲۴-۲۸)

و در کنار این ابزار دستگاه‌های دیگری نظیر دستگاه‌های زیر به کار می‌روند:

اسکنر نوری سه بعدی سطح بدن، مازول نمونه برداری یا بیوبسی^۹، یونیت انژیوگرافی^{۱۰} و یک سیستم ناوبری (بازو) که برای هدایت تصویربرداری استفاده می‌شود. ضمناً یک سیستم کامپیوتربی جهت مستند سازی، مجهز به نرم افزارهای شبیه ساز سه بعدی نیز وجود دارد (۲۴-۲۸).

در واحد تحقیقاتی ویرتوپسی^{۱۱} اعمال زیر انجام می‌شود:

• اسکن نوری سه بعدی سطح بدن و عکاسی

^۱ Virtual Autopsy^۲ Virtopsy^۳ Micro CT^۴ Multi-Slice Computed Tomography (MSCT)^۵ Magnetic Resonance Imaging (MRI)^۶ Microscopic (MRI)^۷ Magnetic Resonance Spectroscopy^۸ 3-D CAD/Photogrammetry^۹ Biopsy Module^{۱۰} Angiography unist^{۱۱} Virtopsy

-۲ تبدیل داده دریافت شده به فرمت استاندارد

DICOM یا همان ACR – NEMA

-۳ ارسال داده‌های استاندارد به کنترل کننده

(۳۹-۴۲) PACS

-۳ کنترل کننده :PACS

اجزای اصلی قسمت کنترل کننده در سیستم PACS عبارتند از: سرویس دهنده / پایگاه داده / و قسمت آرشیو. که به منظور دریافت تصاویر پزشکی از کامپیوتر اخذ داده، استخراج اطلاعات متن موجود در تصاویر، به هنگام کردن اطلاعات مربوط به شبکه سیستم، تعیین اینکه تصاویر باید به کدام ایستگاه‌های نمایش فرستاده شوند، بازیابی خودکار تصاویر مقایسه‌ای از آرشیو، تعیین کنتراست و روشنایی بهینه برای نمایش تصاویر، فشرده سازی تصاویر، آرشیو کردن تصاویر جدید در دیسکهای نوری، حذف تصاویر آرشیو شده از کامپیوتر اخذ داده، ایجاد قابلیت بازیابی تصاویر از ایستگاه‌های کاری مختلف به کار می‌رود (۳۹-۴۴).

-۴ نحوه ارتباط:

نحوه ارتباط اجزاء PACS در قالب یک شبکه با رعایت استانداردهایی برای عملکرد یکپارچه و هماهنگ هر سیستمی از جمله سیستم PACS امکان‌پذیر است. از DICOM برای تبادل تصاویر پزشکی و اطلاعات مرتبط با ان استفاده می‌شود. در واقع هدف ان ایجاد ارتباط و بهبود تأثیر جریان کاری میان سیستم‌های تصویربرداری و سایر سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشد (۸۰). استاندارد DICOM واحد سطوح مختلف پشتیبانی می‌باشد.

امروزه تمام وسایل تصویربرداری که در رادیولوژی، استفاده می‌شوند: مثل CT، MRI، سونوگرافی از استاندارد DICOM برای تبادل تصاویر و اطلاعات مرتبط استفاده می‌کنند. استفاده سایر ابزارهای تخصصی (مانند اندوسکوپی، پاتولوژی، افتالوموسکوپی و درماتولوژی) از DICOM نیز آغاز شده است. دایکام یک سند چند بخشی برای پردازش و ذخیره سازی تصاویر پزشکی است و باید آرشیو تصاویر دیجیتال پزشکی با فرمت دایکام DICOM در سیستم PACS وجود داشته باشد. همچنین سیستم PACS باید امکان ارسال و دریافت تصاویر دیجیتال پزشکی با فرمت دایکام DICOM به ایستگاه‌های کاری DICOM WorkStations داخل مرکز درمانی را داشته باشد (۳۹-۴۴).

ضمناً نرم افزار نمایش دهنده که فقط تصاویر را نشان می‌دهد و در اکثر ایستگاه‌ها نصب می‌شود. این نرم افزار نمایش دهنده، علاوه بر نمایش، امکان پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی با فرمت DICOM را فراهم می‌آورد و سیستم PACS امکان ارسال و دریافت تصاویر دیجیتال پزشکی با فرمت DICOM به خارج مرکز درمانی را دارد. علاوه بر آن سیستم PACS امکان اتصال به

تصاویر را در شبکه‌های دیجیتال بر عهده دارد. این سیستم شامل یک مجموعه نرم افزار تحت شبکه است که به صورت کلی، تصاویر را از دستگاه‌های تصویربرداری با خروجی دیجیتال مانند CT، MRI، رادیوگرافی دیجیتال دریافت می‌کند (۲۴، ۳۳-۳۵) و در کالبدشکافی مجازی یا ویرتوپسی جهت دریافت تصاویر، باگانی تصاویر، انتقال تصاویر، بازسازی تصاویر و نمایش و پردازش تصاویر به کار می‌رود (۲۴، ۳۳-۳۵).

در یک مجموعه تصویربرداری، شامل دستگاه‌های تصویربرداری، دستگاه‌های چاپ فیلم و نرم افزار PACS، استانداردی تحت عنوان DICOM حاکم است که از عبارت Digital Imaging and Communication in Medicine استخراج شده است. در واقع استانداردی در زمینه ارتباط سیستم‌ها است که کلیه سیستم‌های تصویربرداری می‌باشد با آن هم‌خوانی داشته باشد (۲۴، ۳۳-۳۵).

سیستم ارتباطات و بازیابی تصاویر (PACS):

PACS سیستمی است که ذخیره، پردازش و مشاهده تصاویر و اطلاعات مربوط به آن را برای پزشکان تسهیل می‌کند. معرفی سرویس گیرنده / سرویس دهنده، بهبود تصویربرداری دیجیتال و فناوری‌های شبکه سازی، همراه با پیشرفت و استاندارد HL7 و DICOM در کنار سیستم‌های اطلاعاتی راه حل ایده آلی برای مدیریت تصاویر است.

بخش‌های مختلف PACS عبارتند از:

۱- سیستم‌های تصویرگری:

سیستم‌های تصویربرداری مختلف نظیر: اولتراسون، MRI، رادیوگرافی کامپیوترا (CT) و غیره که تصاویر حاصل از آنها دیجیتال است (۲۴، ۳۳-۳۶).

اگر خروجی سیستم تصویربرداری نظیر تصاویری که به وسیله اشعه X گرفته می‌شوند غیر دیجیتال باشند برای استفاده در سیستم PACS و رادیولوژی دیجیتال باید با کمک دیجیتايزرها به فرمت دیجیتال درآیند (۳۷-۴۰).

۲- اخذ داده‌ها:

برای دریافت تصاویر به همراه گزارش آنها از دستگاه‌های پزشکی PACS از یک کامپیوتر اخذ داده که در بلوک کلی در قسمت Interface دارد استفاده می‌شود. این کامپیوتر بین دستگاه تصویربرداری و سایر قسمت‌های PACS قرار می‌گیرد و سه وظیفه اصلی دارد که عبارتند از:

۱- گرفتن داده تصویری از دستگاه تصویر برداری

است. در مقایسه با سی تی اسکن حساس‌تر و اختصاصی‌تر است و برای بررسی اشیا یا ضایعات کوچک و جزئی می‌توان از آن استفاده کرد. (۲۴-۲۸) تصویربرداری در پزشکی قانونی، پس از مرگ و کالبدشکافی دارای پیشینه‌ای طولانی است. گروههای جهت پژوهش در پزشکی قانونی اروپا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و آسیا تشکیل شده‌اند اهمیت ویژه‌ای به استفاده از ابزار تصویربرداری به جای کالبد شکافی قائل هستند (۶۲-۶۶). در حال حاضر به منظور پاتولوژی کالبد شکافی در پزشکی قانونی، تصویربرداری پس از مرگ، هنوز به حد قابل مقایسه با آسیب شناسی که در پزشکی قانونی استفاده می‌شود نیست و به ندرت در تشخیصات پزشکی قانونی استفاده می‌شود (۳۷). در شرایط خاص، نمونه بافت استخوان با Micro-CT و Micro-MR مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمان اسکن کوتاه از ۱ تا ۱۰ دقیقه می‌باشد (۶۹). در بسیاری از موارد، وضوح اسکنرهای بالینی برای پاسخ به سؤالات پزشکی قانونی کافی نیست و این به نفع ایده استفاده از روش‌های تصویربرداری میکروسکوپیستگ غیرتهاجمی با وضوح بسیار بالا برای تجسم نمونه‌های پزشکی قانونی است (۲۴، ۲۷).

MRI، دارای اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی MRS همراه با پتانسیل بسیار زیادی در مستند سازی متابولیسم غلظت در بافت‌ها قبل از مرگ و پس از مرگ می‌باشد. از آنجا که تجزیه به طور مداوم انجام می‌شود، غلظت ترکیبات شیمیایی تغییر نموده بنابراین MRS در تعیین زمان مرگ مفید می‌باشد (۷۰-۷۲). در بسیاری از موارد، از میکرو توموگرافی یا میکرو-CT در موارد پزشکی قانونی برای تعیین الگوی آسیب سلاح درگیر (شی کوچک) در داخل استخوان استفاده می‌شود (۲۸، ۲۴-۲۸).

پزشکی قانونی برای مطالعه آسیب‌های بافت نرم، خونریزی شبکیه و صدمه الکتریکی به پوست از میکرو MRI استفاده می‌کند (۲۴، ۲۷). در حالت کلی، جهت تصویربرداری پس از مرگ، MRI در ترکیبی با سی تی اسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد (۷۹-۸۵)، ام آر آی وقت گیر تر است و گران تر از سی تی اسکن است و دسترسی به اسکن MRI محدود است. کالبد شکافی مجازی نشان دهنده ابزاری ارزشمند جهت جمع آوری مدارک نتایج پاتولوژیکی مانند ضایعات آهکی سیستم قلبی عروقی، شکستگی استخوان، ضایعات سیستم عضلانی، تجمع هوا در پزشکی روز است (۲۴، ۲۷).

دو شیوه جدید مستند سازی قانونی تلفیق تصویربرداری با روش‌های تصویربرداری سطحی (نظیر فتوگرامتری یا اسکن سه بعدی)، ترکیب روش‌های تصویربرداری غیرتهاجمی با نمونه‌برداری بافتی تحت هدایت تصویر شکل گرفته است.

اینترنت Web PACS جهت ارتباطات شبکه‌ای را دور و همچنین قابلیت امکان آرشیو و بازیابی تصاویر در SQL را دارد (۳۹-۴۵). تکنیک کالبدشکافی مجازی یا ویرتوپسی:

توموگرافی کامپیوتراپی پس از مرگ^۱ به شیوه تصویربرداری با استفاده از دستگاه‌های تصویربردار پس از مرگ جهت روشن نمودن علت مرگ (۴۵-۵۰) در زمینه‌هایی که کالبدشکافی جهت تشخیص علت مرگ غیرعملی یا غیر ممکن باشد، اطلاق می‌شود. به عنوان مثال گزارشاتی که در زمینه بررسی توزیع گاز (۵۰-۶۰) یا تعیین بلوغ اسلکتی (۶۱) منتشر شده است، نشان داده که استفاده از آن مفید واقع شده است. شیوه‌های تصویربرداری نظریه توموگرافی کامپیوتراپی یا سی تی اسکن (CT) و تصویربرداری با تشدید مغناطیسی یا ام آر آی (MRI) پزشکی نه تنها به منظور دلایل تشخیصی در طب بالینی، بلکه به عنوان سند و مدرک، دادگاه‌ها را نیز متحول ساخته است.

در کنار این‌ها استفاده از تکنیک‌های جدید رادیولوژی دیجیتال مانند توموگرافی کامپیوتراپی چند تکه (MSCT) که برای ایجاد تصاویر زنده از داخل بدن انسان بکار می‌روند یا اسکنرهای نوری سه بعدی که تصاویر سه بعدی از اجسام و نواحی آسیب دیده در مصدومان تهیه کنند یا فتوگرامتری با اسکن سطح سه بعدی، نیز خدمات عالی برای بررسی ارائه نموده و تبدیل به ابزار اصلی آسیب‌شناسان پزشکی قانونی در آینده شوند. بنابراین، پزشکان نیاز به درک اصول هر یک از تکنیک‌ها و نیز محدودیت‌های آن‌ها برای استفاده بهینه از توانمندی‌های هر یک از روش‌ها می‌باشند. اسکن MSCT زمانی بسیار کمتر از یک کالبد شکافی فیزیکی را نیاز دارد. معاینه مجازی همچنین می‌تواند زمان لازم برای یک تحقیق فیزیکی را کاهش دهد زیرا آسیب شناسی با دانش قبلی مسلح است. استفاده از تصاویر سی تی اسکن در کالبد شکافی مجازی اشکالات مخصوص به خود را دارد. سی تی اسکن در نشان دادن استخوان و فلز بسیار خوب است، اما بافت‌های نرم مختلف اغلب در یک تصویر ظاهری شبیه به هم دارند و حجم تصویر سی تی اسکن جهت ذخیره سازی نیز بسیار بالا و زمان بر MSCT است. به عنوان مثال تجسم کردن استخوان، گاز و فلز با نسبتاً آسان است، شده اما افتراق بافت نرم محدود است. سی تی اسکن در تشخیص شکستگی‌ها تجمع غیر طبیعی گاز در نسوج (نظیر آمبولی هوا، آمفیزم زیر جلدی، ترومای هیپریار، یا تجمع گاز ناشی از فساد نعشی) و خدمات ماکروسکپیک نسوج از دقت بالایی برخوردار است. ام آر آی برای تشخیص صدمات نسوج نرم و ضایعات تروماییک و غیرتروماتیک مغزی دقت بیشتری داشته

^۱ Post-mortem computed tomography (PMCT)

در کالبدشکافی مجازی موجب فراهم آوردن امکان تبادل و انتشار آن از طریق اینترنت را فراهم می‌آورد، بنابراین علاوه بر سهولت دستیابی به هدف کالبدشکافی، با این روش، امکان ارائه خدمات تشخیصی از راه دور که یکی از کاربردهای پزشکی از راه دور (Telemedicine) است فراهم می‌گردد (۲). داده‌هایی که با استفاده از تکنیک‌های رادیولوژی و تکنولوژی‌های مدرن تصویربرداری برای پاتولوژیست و پزشکی قانونی فراهم می‌شود اگر به دقت و با تخصص تفسیر شود به مراتب دقیق‌تر از چشم انسان است. تصویربرداری اولیه پزشکی قادر به شناسایی جزئیات مهم مربوط به جسد است در حالی که کالبد شکافی فیزیکی نمی‌تواند بدون دشواری بسیار، مواردی مانند مکان و تعداد اجسام خارجی (۷۶)، شکستگی‌های ریز استخوانی (۷۷) و میزان حجم گاز یا مایع را به خوبی مشخص کند (۶۹، ۷۴). ماهیت غیرتهاجمی بودن virtopsy در مواردی که دغدغه‌های مذهبی و یا اخلاقی به وجود می‌آیند، آن را قابل قبول‌تر می‌سازد (۷۵). کلاً، وظیفه بالا بردن و گذاشتن کیسه بدن روی میز اسکن و قرار دادن سوزن بیوبسی در اتوپسی مجازی به مراتب کمتر از پیچیده‌تر از شکافتن شکم جسد پیچیدگی دارد (۷۳). و نهایتاً بهتر است کالبدشکافی مجازی یا ویرتوپسی در کنار کالبدشکافی سنتی صورت پذیرد.


داده‌های کالبدشکافی مجازی

داده‌های حاصل از کالبدشکافی مجازی بر اساس دیاگرام زیر بدست می‌آیند.

بسته‌های نرم افزاری که مشاهده و تفسیر مجموعه داده‌های با حجم بالا را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کنند به منظور تسهیل ارائه تصویری از داده‌های تصویربرداری کالبدشکافی پس از مرگ در سیستم‌های کامپیوتری واحدهای ویرتوپسی وجود دارند. تکنیک‌های پس پردازش مختلف می‌تواند شواهد پزشکی قانونی قوی را برای استفاده در روند مراحل قانونی ارائه نماید. شیوه‌های تصویربرداری و ثبت دیجیتال امکان آرشیو فشرده اطلاعات را فراهم کرده و از هزینه‌های اضافی بابت نگهداری مدارک به شیوه سنتی و نیز اختصاص فضای فیزیکی به مکانی جهت بایگانی جلوگیری می‌کند.

Virtopsy تعداد هنگفت از داده‌های DICOM دیجیتال را که می‌تواند به راحتی بر روی یک شبکه، انتقال و کپی، به لحاظ کمی تجزیه و تحلیل شود و بعد از پردازش بر روی یک ایستگاه کاری آرشیو شود ایجاد کرد. فرمت دیجیتال اجازه فشرده (PACS = picture archiving and communication system) (۲۴، ۷۷).

داده‌های سه بعدی در یک ایستگاه کاری PACS به تصاویر دو بعدی قابل مشاهده بر روی مانیتور یا فیلم تبدیل می‌شود. تصاویر مناسب ارائه شده باید بینندگان را به درک مناسبی از زمینه آناتومی جسم برساند. مزیت ثبت داده‌ها به صورت دیجیتال



(مورفولوژی = ریخت شناسی) استخوان‌ها و بافت نرم و عضلات با استفاده از دستگاه سی تی اسکن چند بخشی، تصویربردار ام آر ای و ارزیوگرافی غیرتهاجمی انجام می‌شود و بیوبسی با راهنمای

بررسی سطح بدن با استفاده از اسکن ۳ بعدی رنگی کدگذاری شده انجام می‌شود و بررسی حجم بدن به صورت ماکرو مورفولوژی و میکرومورفولوژی صورت می‌گیرد که در ماکرومورفولوژی

پس از نابودی جسد، انجام اتوپسی به صورت مجازی امکان پذیر است. فراهم آمدن امکان مشاوره با سایر متخصصان از طریق آرشیو دیجیتال و معاینه اجساد در شرایطی که بنا به محدودیت‌های فرهنگی یا مذهبی امکان اتوپسی اجساد وجود ندارد را نام برد (۲۷-۲۴).

معایب:

- هزینه‌های قابل ملاحظه و بالا
- روش تصویربرداری با استفاده از دستگاه MRI قادر به انجام موارد زیر نیست:

تصویربرداری از ضایعات عروق کرونر (۸۱)
افتراءخ خون منعقد شده در رگ از لخته پس از مرگ (۸۲)
تمایز ترومبوуз ریوی از ترشحات سینه پهلوی (۸۳)

موانع:

بعد از حدود یک دهه پژوهش، مشکلات مختلفی از جمله هزینه بالا، رقبت برای دسترسی به دستگاه‌های تصویربرداری و برخی محدودیت‌های ذاتی فن آوری از کالبد شکافی مجازی جلوگیری می‌کند. استاندارد سازی این فرایند، عوامل انسانی، هزینه اولیه برای راه اندازی این سیستم‌ها از جمله مشکلاتی هستند که مانع بکار گیری گسترده اتوپسی مجازی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما گردد. البته نباید فراموش شود که علیرغم هزینه اولیه بالا استفاده از این سیستم منجر به صرفه جویی اقتصادی خواهد شد (۲۷-۲۴). مهم‌ترین موانع احتمالی برای پیاده‌سازی سیستم ویرتوپسی در کشور این است که پزشکان قانونی و متخصصین پاتولوژی هنوز عادت به سیستم مجازی ندارند. همچنین هزینه پیاده‌سازی این سیستم بالا است. داده‌هایی که با استفاده از تکنیک‌های رادیولوژی و تکنولوژی‌های مدرن تصویربرداری برای پاتولوژیست و پزشکی قانونی فراهم می‌شود اگر به دقت و با تخصص تفسیر شود به مراتب دقیق‌تر از چشم انسان است.

تصویربرداری اولیه پزشکی قادر به شناسایی جزئیات مهم مربوط به جسد است در حالی که کالبد شکافی فیزیکی نمی‌تواند بدون دشواری بسیار، مواردی مانند مکان و تعداد اجسام خارجی، شکستگی‌های ریز استخوانی و میزان حجم گاز یا مایع را به خوبی مشخص کند. ماهیت غیرتهاجمی بودن virtopsy در مواردی که دغدغه‌های مذهبی و یا اخلاقی به وجود می‌آیند، آن را قابل قبول تر می‌سازد. کلاً، وظیفه بالا بردن و گذاشتن کیسه بدن روی میز اسکن و قرار دادن سوزن بیوپسی در اتوپسی مجازی به مراتب کمتر از پیچیده‌تر از شکافتن شکم جسد پیچیدگی دارد. و نهایتاً بهتر است کالبدشکافی مجازی یا ویرتوپسی به عنوان مکملی در کنار کالبدشکافی سنتی صورت پذیرد.

تسبییری هم به صورت میکرو مارفلوژی از استخوان‌ها و بافت نرم توسط دستگاه ام ار ای میکروسکوپی. میکروسی تی اسکن انجام شده و نتایج آن‌ها جماعتی می‌شود.

بحث و نتیجه گیری

استانداردها، مزایا، معایب و موانع:

کالبدشکافی مجازی یک روش غیرتهاجمی و تجدید پذیراست. ایجاد پرونده‌های دیجیتالی و دائمی از بدن برای پاتولوژیست و پزشکی قانونی به همراه امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و مشاوره پزشکی از راه دور پزشکی قانونی فراهم می‌شود. حمل و نقل نمونه‌های واقعی بین پاتولوژیست‌ها مشکل است، در حالی که تصویر دیجیتالی از بدن می‌تواند به صورت الکترونیکی در میان آسیب‌شناسان و پزشکی قانونی به اشتراک گذاشته و برای مطالعه در آینده ذخیره شود. پاتولوژیست و پزشکی قانونی می‌توانند کالبد شکافی را از طریق اینترنت انجام دهند، بنابراین برخی از بیمارستان‌ها دیگر نیازی به استخدام پاتولوژیست و پزشکی قانونی ندارند.

با بهره‌گیری از این تکنیک بررسی علل ۶۰ تا ۸۰ درصد مرگ‌های ناگهانی یا غیرطبیعی ممکن خواهد بود.

همچنین این روش آمار دیجیتالی و دائمی را در اختیار پزشکان قرار می‌دهد که از طریق اینترنت قابلیت به اشتراک گذاشتن دارند (۲۷-۲۴).

Virtopsy خونریزی داخلی، مسیر گلوله و شکستگی پنهان و دشوار برای پیدا کردن در یک کالبد شکافی سنتی را تشخیص می‌دهد. همچنین به کمک MSCT و ام آر آی در تصویر الگوهای شکستگی استخوان، و تکه تکه شدن، کوفتگی مغز، محل گلوله، آمبولی و آسپیراسیون خون به ریه را تشخیص می‌دهد (۲۷-۲۴).

نظام قضایی نیز از این تکنولوژی جدید بهره‌مند می‌شود و می‌تواند تصاویر سه بعدی کالبد شکافی را به راحتی در دادگاهها به جای تصاویر وحشتناک کالبد شکافی سنتی از بدن قربانی نگاه نشان داده شود. اگر چه تجهیزات مورد نیاز در انجام کالبد شکافی مجازی بسیار گران قیمت هستند، اما فرآیند کالبد شکافی مجازی در استفاده از منابع بسیار ارزان‌تر از کالبد شکافی مجازی بدن سالم آسان تر خواهد بود. ضمناً در کالبد شکافی مجازی بدن سالم می‌ماند و بنابراین به احساس غم و اندوه خانواده قربانی نمی‌افزاید. این نیز بر موانع منع کالبد شکافی اجساد توسط ادیان غله می‌کند. مزایای اتوپسی مجازی رادیولوژیک را می‌توان سهولت ارزیابی و معاینه اجساد آلوده به مواد سمی، رادیواکتیو یا ارگانیسم‌های آلاینده، مستندسازی دقیق یافته‌های معاینه جسد به گونه‌ای که هر زمان و در هر مکانی از جمله دادگاه و مدت‌ها

References:

1. Toorchian F. Special techniques: radiology, CT, MRI, and nuclear medicine. Tehran: Noore Danesh Press; 2003. (Persian)
2. Sosa-Iadicissa M, Wootton R, Ferrer-Roca O. Historia de la Telemedicina. In: *Telemedicina*. Madrid: Panamericana; 2001. P.1-18.
3. Rubin M A, Putzi M, Mucci N, Smith D C, Wojno K, Korenchuk S, et al. Rapid ("warm") autopsy study for procurement of metastatic prostate cancer. *J Clin Cancer Res* 2000;6(3): 1038-45.
4. Rutty G N. Are autopsies necessary?. *Rechtsmedizin* 2007; 17(1): 21-8.
5. Von Staden H. The discovery of the body: human dissection and its cultural contexts in ancient Greece. *Yale J Biol Med* 1992; 65(3): 223.
6. Horowitz RE, Naritoku WY. The autopsy as a performance measure and teaching tool. *Human Pathol* 2007; 38(5): 688-95.
7. Krukemeyer MG, Dankof A, Krenn V, Hansen D, Dietel M. Necessity of increasing autopsy frequency following the introduction of DRGs. *Der Pathologe* 2007;28(4): 294.
8. Fisher R S, Spitz WU. Medicolegal investigation of death: guidelines for the application of pathology to crime investigation. Springfield, IL: Charles C. Thomas; 1980.
9. Kaplan WD, Takvorian T, Morris JH, Rumbaugh CL, Connolly BT, Atkins HL. Thallium-201 brain tumor imaging: a comparative study with pathologic correlation. *J Nucl Med* 1987;28(1):47-52.
10. Brinkmann B, Chesne A Du, Vennemann B. Recent data for frequency of autopsy in Germany. *Dtsch Med Wochenschr* 2002; 127(15): 791.
11. Chariot P, Witt K, Pautot V, Porcher R, Thomas G, Zafrani E S, et al. Declining autopsy rate in a French hospital: physicians' attitudes to the autopsy and use of autopsy material in research publications. *Arch Pathol Lab Med* 2000; 124(5): 739-45.
12. Lindstrom P, Janzon L, Sternby N H. Declining autopsy rate in Sweden: a study of causes and consequences in Malmo, Sweden. *J Intern Med* 1997; 242(2): 157-66.
13. Start RD, McCulloch TA, Benbow E W, Lauder I, Underwood J C E. Clinical necropsy rates during the 1980s: the continued decline. *J Pathol* 1993; 171(1): 63-6.
14. Harrington DE, Edward AS. Managed care and measuring medical outcomes: Did the rise of HMOs contribute to the fall in the autopsy rate?. *Soc Sci Med* 2010; 70(2): 191-8.
15. Davies DJ, Graves, Landgren AJ, Lawrence CH, Lipsett J, MacGregor DP, et al. The decline of the hospital autopsy: a safety and quality issue for healthcare in Australia. *Med J Aust* 2004 ;(180): 281-5.
16. Toyohiko M. A statistical study of lung cancer in the annual of pathological autopsy cases in Japan, from 1958 to 1997, with reference to time trends of lung cancer in the world. *Cancer Sci* 2002; 93(1): 15-23.
17. Westphal SE, Apitzsch J, Penzkofer T, Mahnken AH, Knüchel R. Virtual CT autopsy in clinical pathology: feasibility in clinical autopsies. *Virchows Arch* 2012; 461(2): 211-19.
18. Sebire NJ. Towards the minimally invasive autopsy?. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2006; 28(7): 865-7.
19. Oluwasola OA, Fawole OI, Otegbayo AJ, Ogun GO, Adebamowo CA, Bamigboye AE. The autopsy: knowledge, attitude, perceptions of doctors and relatives of the deceased. *Arch Pathol Lab Med* 2009; 133(1): 78-82.
20. Burton, Julian L, Underwood J. Clinical, educational, epidemiological value of autopsy. *Lancet* 2007; 369(9571): 1471-80.

21. Said F, El Beshlawy A, Hamdy M, El Raziky M, Sherif M, Ragab L. Intrafamilial transmission of hepatitis c infection in egyptian multitransfused thalassemia patients. *Trop Paediatr J* 2013.
22. Hill RB, Anderson RE. The uses and value of autopsy in medical education as seen by pathology educators. *Acad Med* 1991; 66(2): 97-100.
23. Dirnhofer R, Jackowski C ,Vock P, Potter K, Thali M J. Virtopsy: minimally invasive, imaging-guided virtual autopsy. *Radiographics* 2006;26(5): 1305-33.
24. Thali M J, Jackowski C, Oesterhelweg L, Ross S G, Dirnhofer R. VIRTOPSY—the Swiss virtual autopsy approach. *Leg Med* 2007;9(2): 100-4.
25. Thali M J, Yen K, Schweitzer W, Vock P, Boesch C, Ozdoba C, et al. Virtopsy, a new imaging horizon in forensic pathology: virtual autopsy by postmortem multislice computed tomography (MSCT; and magnetic resonance imaging) MRI a feasibility study. *J Forensic Sci* 2003; 48(2): 386-403.
26. Bolliger SA, Thali MJ, Ross S, Buck U, Naether S, Vock P. Virtual autopsy using imaging: bridging radiologic and forensic sciences. A review of the virtopsy and similar projects. *Eur Radiol* 2008;18(2): 273-82.
27. Thali M J ,Yen K, Vock P, Ozdoba C, Kneubuehl BP, Sonnenschein M, Dirnhofer R. Image-guided virtual autopsy findings of gunshot victims performed with multi-slice computed tomography (MSCT; and magnetic resonance imaging)MRI; and subsequent correlation between radiology and autopsy findings. *Forensic Sci* 2003; 138(1): 8-16.
28. Ebert LC, Ptacek W, Naether S, Fürst M, Ross S, Buck U, Thali, M. Virtobot-a multi-functional robotic system for 3D surface scanning and automatic post mortem biopsy. *Int J Med Robot Comp* 2010;6(1): 18-27
29. Thali M J, Braun M, Buck U, Aghayev E, Jackowski C, Vock P, Dirnhofer R. Virtopsy—scientific documentation, reconstruction and animation in forensic: individual and real 3D data based geo-metric approach including optical body/object surface and radiological CT/MRI scanning. *J Forensic Sci* 2005;50(2): 428-42.
30. Ebert L C, Ptacek W, Naether S, Fürst M, Ross S, Buck U, et al. Virtobot-a multi-functional robotic system for 3D surface scanning and automatic post mortem biopsy. *Int J Med Robot Comp* 2010;6(1): 18-27
31. Jackowski C, Sonnenschein M, Thali M J, Aghayev E, von Allmen G, Yen K, et al. Virtopsy: postmortem minimally invasive angiography using cross section techniques—implementation and preliminary results. *J Forensic Sci* 2005; 50(5): 1175-86.
32. Faggioni L, Neri E, Castellana C, Caramella D, Bartolozzi C. The future of PACS in healthcare enterprises. *Eur J Radiol* 2011; 78(2): 253-8.
33. Aghayev E, Staub L, Dirnhofer R, Ambrose T, Jackowski C, Yen K, et al. Virtopsy—the concept of a centralized database in forensic medicine for analysis and comparison of radiological and autopsy data. *J Forensic Sci Leg Med* 2008; 15(3): 135-40.
34. Nissan E. Virtopsy: the virtual autopsy in computer applications for handling legal evidence, police investigation and case argumentation. Netherlands: Springer; 2012. P. 991-1015.
35. Faggioni L, Neri E, Castellana C, Caramella D, Bartolozzi C. The future of PACS in healthcare enterprises. *Eur J Radiol* 2011; 78(2): 253-8.
36. Caramella D. Is PACS research and development still necessary?. In International Congress Series. Philaelphia: Elsevier; 2005. P. 11-14.
37. Huang HK. Enterprise PACS and image distribution. *Comput Med Imaging Graph* 2003; 27(2): 241.
38. van de Wetering R, Batenburg R. A PACS maturity model: a systematic meta-analytic review

- on maturation and evolvability of PACS in the hospital enterprise. *Int J Med Sci Info* 2009;78(2): 127-40.
39. Warburton RN. Evaluation of PACS-induced organizational change. *Int J Biomed Comput* 1992; 30(3): 243-8.
40. Amis ES, Butler PF, Applegate KE, Birnbaum SB, Brateman LF, Hevezi JM, et al. White Paper on Radiation Dose in Medicine. *J Am Coll Radiol* 2007;4:272-84.
41. National Electrical Manufacturers Association. Digital Imaging and Communications in Medicine supplement 94: diagnostic x-ray radiation dose reporting (dose SR). Available at: ftp://medical.nema.org/medical/dicom/final/sup94_ft.pdf.
42. Graham RNJ, Perriss RW, Scarsbrook AF. DICOM demystified: a review of digital file formats and their use in radiological practice. *Clin Radiol* 2005; 60(11): 1133-40.
43. Mackinnon AD, Billington RA, Adam EJ, Dundas DD, Patel U. Picture archiving and communication systems lead to sustained improvements in reporting times and productivity: results of a 5-year audit. *Clin Radiol* 2008;63(7): 796-804.
44. Reijns GL. Integration in PACS of DICOM with TCP/IP, SQL, X Windows in medical imaging. *Int Soc Opt Photo* 1994: 744-53.
45. Krantz P, Holtas S. Postmortem computed tomography in a diving fatality. *J Comp Assist Tomography* 1983;7(1): 132-4.
46. Donchin Y, Rivkind AI, Bar-Ziv J, Hiss J, Almog J , Drescher M. Utility of postmortem computed tomography in trauma victims. *The J Trauma Acute Care Surg* 1994;37(4): 552-6.
47. Wallace S K, Cohen W A, Stern E J, Reay D T. Judicial hanging: postmortem radiographic, CT, MR imaging features with autopsy confirmation. *Radiology* 1994; 193(1): 263-7.
48. Shiotani S, Kohno M, Ohashi N, Yamazaki K, Nakayama H ,Watanabe K, et al. Non-traumatic postmortem computed tomographic (PMCT; findings of the lung. *Forensic Sci Int* 2004; 139(1): 39-48.
49. Farkash, Uri, Alon Scope, Mauricio Lynn, Chen Kugel, Ron Maor, Avi Abargel, et al. Preliminary experience with postmortem computed tomography in military penetrating trauma. *J Trauma Acute Care Surg* 2000;48(2): 303-9.
50. Christian J, Thali M, Sonnenschein M, Aghayev E, Yen K, Dirnhofer R, et al. Visualization and quantification of air embolism structure by processing postmortem MSCT data. *J Forensic Sci* 2004;49(6): 1339-42.
51. Shiotani S, Kohno M, Ohashi N, Yamazaki K, Nakayama H ,Watanabe K, et al. Non-traumatic postmortem computed tomographic (PMCT; findings of the lung. *Forensic Sci Int* 2004; 139(1): 39-48.
52. Aghayev E, Yen K, Sonnenschein M, Jackowski C, Thali MJ, Peter Vock, et al. Pneumomediastinum and soft tissue emphysema of the neck in postmortem CT and MRI; a new vital sign in hanging?. *Forensic Sci Int* 2005;153(2): 181-8.
53. Yokota H, Yamamoto S, Horikoshi T, Shimofusa R, Ito H. What is the origin of intravascular gas on postmortem computed tomography?. *Leg Med* 2009;11 : 252-5.
54. Shiotani S, Ueno Y, Atake S, Kohno M, Suzuki M, Kikuchi K, et al. Hayakawa Nontraumatic postmortem computed tomographic demonstration of cerebral gas embolism following cardiopulmonary resuscitation. *JPN J Radiol* 2010;28 : 1-7.
55. Germerott T, Flach PM, Preiss US, Ross SG, Thali MJ. Postmortem ventilation: a new method for improved detection of pulmonary pathologies in forensic imaging. *Leg Med* 2012; 14: 223-8.

56. Michiue T, Sakurai T, Ishikawa T, Oritania S, Maeda H. Quantitative analysis of pulmonary pathophysiology using postmortem computed tomography with regard to the cause of death. *Forensic Sci Int* 2012;220: 232-8.
57. Kohno SM, Ohashi N, Yamazaki K, Nakayama H, Watanabe K, Oyake Y, et al. Non-traumatic postmortem computed tomographic (PMCT) findings of the lung. *Forensic Sci Int* 2004; 139: 39-48.
58. Levy AD , Harcke HT, Getz JM, Mallak CT, Caruso JL, Pearse L, Frazier AA , et al. Virtual autopsy: two- and three-dimensional multidetector CT findings in drowning with autopsy comparison. *Radiology* 2007; 243:862-8.
59. Oyake Y, Aoki T , Shiotani S , Kohno M, Ohashi N , Akutsu H , et al. Postmortem computed tomography for detecting causes of sudden death in infants and children: retrospective review of cases. *Radiat Med* 2006; 24 :493-502.
60. Sakurai T, Michiue T, Ishikawa T, Yoshida C, Sakoda S, Kano T, Oritani S, Maeda H. Postmortem CT investigation of skeletal and dental maturation of the fetuses and newborn infants: serial case study. *Forensic Sci Med Pathol* 2012; 8:351-7.
61. Persson A , Jackowski C , Engström E, Zachrisson H. Advances of dual source, dual-energy imaging in postmortem CT. *Eur J Radiol* 2008;68(3): 446-55 .
62. Rutty G N. Are autopsies necessary? *Rechtsmedizin* 2007; 17(1): 21-8.
63. Woodward P J, Sohaey R, Harris D P , Jackson G M , Klatt E C, Alexander A L, et al. Postmortem fetal MR imaging: comparison with findings at autopsy. *Am J Rhinol* 1997;168(1): 41-6 .
64. O'Donnell C, Woodford N. Post-mortem radiology—a new sub-speciality?. *Clin Radiol* 2008;63(11): 1189-94
65. Shiotani S, Kohno M, Ohashi N, Yamazaki K, Nakayama H, Ito Y, et al. Hyperattenuating aortic wall on postmortem computed tomography PMCT. *Radiat Med* 2002;20(4): 201.
66. Westphal S E, Apitzsch J, Penzkofer T, Mahnken A H , Knüchel R. Virtual CT autopsy in clinical pathology: feasibility in clinical autopsies *Virchows Arch* 2012;461(2): 211-19
67. Wichmann D, Obbelode F, Vogel H, Hoepker WW, Nierhaus A, Braune S, et al. Virtual Autopsy as an Alternative to Traditional Medical Autopsy in the Intensive Care UnitA Prospective Cohort Study. *An Int Med* 2012;156(2): 123-30.
68. Christe A, Flach P, Ross S, Spendlove D, Bolliger S, Vock P, et al. Clinical radiology and postmortem imaging Virtopsy; are not the same: specific and unspecific postmortem signs. *Leg Med* 2010; 12(5): 215-22 .
69. Ith M, Bigler P, Scheurer E, Kreis R, Hofmann L, Dirnhofer R, et al. Observation and identification of metabolites emerging during postmortem decomposition of brain tissue by means of in situ ^1H -magnetic resonance spectroscopy. *Magn Reson Med* 2002; 48(5): 915-20.
70. Scheurer E, Ith M, Dietrich D, Kreis R, Hüslér J, Dirnhofer R, et al. Statistical evaluation of time- \square dependent metabolite concentrations: estimation of post-mortem intervals based on in situ ^1H -MRS of the brain. *NMR Biomed* 2005; 18(3): 163-72 .
71. Delnomdedieu M, Hedlund LW, Johnson GA, Maronpot RR. Magnetic resonance microscopy-A new tool for the toxicologic pathologist. *Toxicol Pathol* 1996;24(1): 36-44 .
72. Dirnhofer R, Jackowski C, Vock P, Potter K, Thali MJ. Virtopsy: minimally invasive, imaging-guided virtual autopsy. *Radiographics* 2006;26(5): 1305-33 .

73. Grabherr S, Stephan BA, Buck U, Näther S, Christe A, Oesterhelweg L, et al. Virtopsy—radiology in forensic medicine. *Decisions MRI* 2007;11(1): 2-9.
74. Flach PM, Ross SG, Bolliger SA, Preiss US, Thali MJ, Spendlove D. Postmortem whole-body computed tomography angiography visualizing vascular rupture in a case of fatal car crash. *Arch Pathol Lab Med* 2010; 134(1): 115-19.
75. O'Donoghue K, O'Regan KN, Sheridan CP, O'Connor OJ, Benson J, McWilliams S, et al. Investigation of the role of computed tomography as an adjunct to autopsy in the evaluation of stillbirth. *Eur J Radiol* 2012;81(7):1667-75.
76. Bolliger S A, Thali MJ, Ross S, Buck U, Naether S, Vock P. Virtual autopsy using imaging: bridging radiologic and forensic sciences: a review of the Virtopsy and similar projects. *Eur Radiol* 2008;18(2): 273-82.
77. Ikeda G, Yamamoto R, Suzuki M, Ishikawa H, Kikuchi K, Shiotani S. Postmortem computed tomography and magnetic resonance imaging in a case of terminal-stage small cell lung cancer: an experience of autopsy imaging in tumor-related death. *Radiat Med* 2007;25(2): 84-7.
78. Stawicki S P, Gracias V H, Schrag S P, Martin N D, Dean A J, Hoey B A. The dead continue to teach the living: examining the role of computed tomography and magnetic resonance imaging in the setting of postmortem examinations. *J Surg Edu* 2008;65(3): 200-5.
79. Escott E, Rubinstein D. Free DICOM image viewing and processing software for your desktop computer: what's available and what it can do for you. *Radiographics* 2003;23(5): 1341-57.
80. OJ, Zaman AG, et al. Noninvasive in vivo magnetic resonance imaging of experimental coronary artery lesions in a porcine model. *Circulation* 2000; 101(25): 2956-61.
81. Roberts I S D, Benbow E W, Bisset R, Jenkins J P R, Lee S H, Reid H, et al. Accuracy of magnetic resonance imaging in determining cause of sudden death in adults: comparison with conventional autopsy. *Histopathology* 2003; 42(5): 424-30.

VIRTUAL AUTOPSY IS SUPPLEMENT FOR AUTOPSY

Ladan soltanzadeh¹, Mehrdad Imanzadeh², Hamid Keshvari^{3}*

Received: 5 Feb, 2013; Accepted: 9 Apr, 2013

Abstract

Background & Aims: Autopsies are recognized as valuable medical procedures. A number of digital radiology techniques, including multislice CT, MRI, and photogrammetry with 3D surface scanning have the potential to change traditional autopsy and improve the reliability of results. Virtual Autopsy is a non-invasive procedure with no damage to the tissues. Noninvasive virtual autopsying could, in some cases, replace the invasive examination altogether. Use of a Picture Archiving and Communications System (PACS) and teleradiology can be considered useful tools in medico-legal investigations.

Materials & Methods: This study is a systematic review using key words "Virtual autopsy", "imaging technologies", "forensics" and "techniques" and "PACS", among about 325 research and review papers in Persian and English in the field of Virtual Autopsy from electronic databases such as CINAHL, Science direct, Ovid, Scopus, SID, Magiran, PubMed, Google scholar; and finally 82 article were assessed. This study has been in 15-year period from 1997 to 2013. Finally, 82 articles in Persian and English.

Results: The results of this study show that medical autopsies rates are declining worldwide. New radiology imaging techniques has the potential to transform the traditional medical autopsy. The minimally invasive nature of virtopsy makes it more acceptable in cases where religious or ethical concerns arise. Virtual autopsy findings can be reviewed and audited in an objective manner at any time by any professional via the use of a Picture Archiving and Communications System (PACS) and teleradiology.

Conclusion: Results of studies indicate that findings identified during physical autopsy often raise additional questions that can be answered by virtual autopsy. In some countries, virtual autopsy is now used routinely for forensic work. Concluding from our observations, unenhanced virtual autopsy represents a valuable tool for documentation of pathologic findings.

Key words: "Virtual autopsy", "imaging technologies", "forensics" and "techniques" and "PACS".

Address: Departement of Biomedical Eng. , Amirkabir University of Technology, 424 Hafez Ave, Tehran, 15875-4413, Tel & Fax: (+98) 21 64 54 24 81

Email: Keshvari@aut.ac.ir

SOURCE: URMIA MED J 2013: 24(4): 276 ISSN: 1027-3727

¹ Msc in Biomedical Eng, Amirkabir University of Technology ,Expert in Urmia University of Medical Sciences

² Member in Departement of Biomedical Eng. , Amirkabir University of Technology

³ Assistant professor of Departement of Biomedical Eng. , Amirkabir University of Technology (Corresponding Author)