

The Relationship between Food Security and Type of Carbohydrate Consumed among Coronary Heart Patients: a Case-Control Study

Gholizadeh E¹, Ayremlou P², Nouri Saeidlou S*³, Rezazadeh A⁴

1. MSc in Nutrition, Department of Nutrition, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

2. MSc of Epidemiology, Clinical Research Development Unit of Imam Khomeini Hospital , Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

3. Assistant Professor of Nutrition, Food and Beverages Safety Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

4. Assistant Professor of Nutrition, Department of Community Nutrition, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran , Iran

*Corresponding author. Tel: +984432766825, Fax: +984432765657, E-mail: saeedlou2003@yahoo.com

Received: Mar 14, 2017 Accepted: Aug 26, 2018

ABSTRACT

Background & objectives: Cardiovascular disease is the main cause of death in many countries, including Iran. This study aimed to determine the relationship between food security and type of carbohydrates consumption in coronary heart diseases patients in Amol city.

Methods: In this case-control study, 180 subjects with coronary heart disease and 370 healthy controls in the Hospital were enrolled. The anthropometric indices and BMI were measured and calculated. The FFQ and food security questionnaires were filled. Data were analyzed using independent T-test, Chi-square test and logistic regression with SPSS (V. 20).

Results: Results showed that more than 80% of subjects in both groups of case and control had food security. More than 17% of cases and 15% of controls had food insecurity. In all participants, safe and non-safe food groups, subjects in the second and third quartiles of complex carbohydrates intakes, had a lower chance of coronary artery disease compared to the first quartile, although this difference was not significant. Higher intakes of simple carbohydrates in three groups (all participants, safe and non-safe) increased the chance of coronary artery disease and this difference was significant between the quartiles. The results showed that the risk of coronary artery disease in the non-safe food group was more than the safe food group .The odds ratio in the fourth quarter for simple carbohydrates among all participants, safe food group and unsafe food group were ($OR=8.36, p<0.001$), $OR=8.33, p<0.001$ and ($OR=11.79, p=0.008$) respectively.

Conclusion: Current study showed that the highest intakes of complex carbohydrates inversely associated with coronary artery disease and the highest intakes of simple carbohydrates increases the risk that is higher in non-safe food group.

Keywords: Coronary Artery Disease; Carbohydrate Type; Food Security

ارتباط امنیت غذایی با نوع کربوهیدرات مصرفی در بیماران عروق کرونر قلب: یک مطالعه مورد- شاهدی

اسماعیل قلیزاده^۱, پروین آبرملوی^۲, سکینه نوری سعیدلو^{۳*}, آرزو رضازاده^۴

۱. کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 ۲. کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 ۳. دکتری علوم تغذیه، مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 ۴. دکتری علوم تغذیه، گروه تغذیه جامعه، انسیتو تحقیقات تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- * نویسنده مسئول. تلفن: ۰۴۴ ۳۳۷۶۵۶۸۲۵ . فکس: ۰۴۴ ۳۳۷۶۵۶۵۷ . ایمیل: saeedlou2003@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی - عروقی اصلی‌ترین علت مرگ و میر در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط امنیت غذایی با نوع کربوهیدرات مصرفی در بیماران عروق کرونر قلب در شهرستان آمل، طراحی و اجرا شد.

روش کار: در این مطالعه مورد- شاهدی، ۱۸۰ بیمار مبتلا به عروق کرونر و ۳۷۰ نفر به عنوان گروه شاهد از بین مراجعه‌کنندگان به بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص‌های تن سنجدی و BMI، اندازه گیری و محاسبه گردید. داده‌های الگوی مصرف کربوهیدرات‌ها با استفاده از پرسشنامه FFQ جمع آوری و شاخص امنیت غذایی از طریق تکمیل پرسشنامه استاندارد تعیین گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل، آزمون مجذور کای و رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از افراد در گروه مورد و شاهد دارای امنیت غذایی بودند. بیش از ۱۷ درصد موردها و ۱۵ درصد از اعضای گروه شاهد دارای نامنی غذایی بودند. در کل شرکت کنندگان، گروه‌های غذایی آمن و نامن غذایی، افراد در چارک‌های دوم و سوم مقادیر کربوهیدرات‌های پیچیده در مقایسه با چارک اول شناس ابتلای کمتری به بیماری عروق کرونر داشتند، هر چند این اختلاف معنادار نبود. مقادیر بالاتر کربوهیدرات‌های ساده در هر سه گروه کل شرکت کنندگان، گروه آمن و گروه نامن غذایی شناس ابتلا به بیماری عروق کرونر را افزایش می‌هد و این اختلاف در بین چارک‌ها معنادار بود. نتایج نشان داد که شناس ابتلا به بیماری عروق کرونر در گروه نامن غذایی بالاتر از گروه آمن غذایی بود، بطوری که نسبت شناس در چارک چهارم برای کربوهیدرات‌های ساده در میان کل شرکت کنندگان $OR=11/79$ و $p=0/08$ ($p < 0/01$). گروه غذایی آمن ($OR=8/33$) و گروه غذایی نامن ($OR=1/01$) بود. بدست آمد.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد مقادیر بالاتر کربوهیدرات‌های پیچیده با شناس ابتلا به بیماری عروق کرونر ارتباط معکوس و مصرف مقادیر بالاتر کربوهیدرات‌های ساده شناس ابتلا به آن را افزایش می‌دهد که این شناس در گروه نامن غذایی بالاتر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: بیماری عروق کرونر، نوع کربوهیدرات، امنیت غذایی

نهاده است که امری نگران‌کننده می‌باشد (۱۳). در بیشتر مطالعات میزان انرژی دریافتی از غذا به عنوان شاخص امنیت غذایی معرفی شده است. اما با توجه به اهمیت عناصر غذایی دیگر نظیر میزان کربوهیدرات‌های دریافتی در سلامت و تامین تنوع غذایی، این عناصر نیز جزوی از شاخص‌های امنیت غذایی مورد توجه هستند (۱۴). مطالعات مختلف شیوع بیشتردیابت در افراد با نامنی غذایی نسبت به سایر افراد با امنیت غذایی را نشان داده است (۱۵، ۱۶). در یک مطالعه مبتنی بر جمعیت، ارتباط بین امنیت غذایی با دیس‌لپیدمی مشخص گردیده است (۱۷). در یک مطالعه نشان داده شده است که دریافت مواد غذایی با کیفیت پایین در افرادی که از ناامنی غذایی برخوردار بودند بیشتر از سایر افراد بوده است (۱۸). بطور خلاصه نتایج مطالعات حاکی از آن بوده است که امنیت غذایی ممکن است با بعضی از عوامل موثر بر بیماری‌های قلب و عروق نه با تمام عوامل در ارتباط باشد. نظر به اینکه تا زمان انجام مطالعه حاضر، مطالعه مشابه در شهرستان آمل صورت نگرفته بود، لذا با توجه به شیوع بیماری‌های قلبی-عروقی و نقش تغذیه در پیشگیری از آن، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط نوع کربوهیدرات‌های مصرفی با امنیت غذایی در بیماران عروق کرونر قلب در شهرستان آمل طراحی و اجرا گردید.

روش کار طراحی مطالعه

مطالعه حاضر از نوع مورد-شاهدی بود که در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلب در شهرستان آمل در سال ۱۳۹۵ انجام شد.

بر اساس فرمول، بر اساس فراوانی مصرف چربی‌های هیدروژنه در مطالعه قبلی (۱۹) (۰/۶٪ در موردها و ۷/۴٪ در گروه کنترل) و با در نظر گرفتن فاصله اطمینان ۹۵ درصد و توان آزمون ۹۰٪ و با احتساب ۲۰ درصد نمونه اضافی، حجم نمونه ۱۸۰

مقدمه

بیماری عروق کرونر قلب یک واژه عمومی برای ساخت پلاک در شریان قلب است که می‌تواند به حمله قلبی منجر شود (۱). این بیماری اصلی‌ترین علت مرگ و میر در تمام دنیا از جمله کشورهای با درآمد متوسط و پایین مانند ایران می‌باشد (۲، ۳). آمارها نشان می‌دهد میزان مرگ ناشی از این بیماری در دنیا در سال‌های اخیر ۳۰ درصد می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا سال ۲۰۲۰ میلادی به بیش از ۴۸ درصد برسد (۴، ۲). بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۴، ۴۶ درصد از تمام علل مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی بوده است (۵). ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در خاورمیانه سبک زندگی غربی را در هردو زمینه عادات غذایی ای پذیرفته است که باعث افزایش شیوع حملات قلبی شده است (۶). نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی با توجه به سن، جنس، نژاد، منطقه جغرافیایی و شرایط اجتماعی اقتصادی همچون سوء تغذیه و امنیت غذایی متفاوت است که این میزان در تمام دنیا از جمله کشورهای در حال توسعه مانند ایران رو به افزایش است (۷). مطالعات نشان داده‌اند که عوامل اجتماعی، اقتصادی و اجزای شیوه زندگی از جمله تغذیه، نقش مهمی در سلامت قلب و عروق فرد دارد (۹، ۸).

نامنی غذایی یکی دیگر از نشانه‌های آشفتگی اجتماعی و اقتصادی است که با عوامل خطر بیماری قلبی عروقی در سال‌های اخیر همراه بوده است (۰، ۱۱، ۱۰). فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) در گزارش وضعیت ناامنی غذایی در سال ۲۰۱۳، بیان کرده است که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ ۶۵ درصد افرادی که غذای کافی برای زندگی سالم و پویا نداشتند در نواحی مختلف آسیا زندگی می‌کردند (۱۲). همچنین بنابر گزارش چشم انداز امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱، روند ضریب تأمین امنیت غذایی در سال‌های اخیر رو به کاهش

فشارخون و مصرف داروهای فشارخون برای شرکت کنندگان در مطالعه پر شد. داده‌های الگوی مصرف مواد غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوارک (FFQ)^۲ به دست آمد (۲۱). USDA, release 28^۳ گرم هر با استفاده از جدول ۲۸ گرم هر واحد ماده غذایی را به دست آورده و سپس در تعداد دفعات مصرف در روز ضرب گردید. سپس میزان مصرف کربوهیدرات‌های ساده و کربوهیدرات‌های پیچیده (اقلام غذایی طبق جدول ۱) در مواد غذایی با یکدیگر جمع شدند که عدد بدست آمده بیانگر میزان مصرف هر کدام از کربوهیدرات‌ها بر حسب گرم در روز (gr/day) می‌باشد.

برای ارزیابی وضعیت امنیت غذایی افراد مورد مطالعه، از پرسشنامه استاندارد HFIAS^۴ که روایی و پایابی آن توسط محمدی نصرآبادی و همکاران (۳۲) در خانوارهای تهرانی، و توسط سالارکیا و همکاران در خانوارهای شهر ورامین (۲۳)، ارزیابی و تایید شده بود، استفاده شد. پرسشنامه مزبور شامل ۹ پرسش در مورد وقوع و به دنبال آن تکرار وقوع حالات و وضعیت‌هایی است که به ترتیب شدت ناامنی غذایی خانوار (از نظر دسترسی) را می‌سنجد. برای هر سؤال (عبارت)، پنج گزینه لیکرت برای پاسخگویی در مورد تعداد دفعات تجربه آن وضعیت، شامل (۰= هرگز، ۱= به ندرت (یک یا دو بار)، ۲= گاهی اوقات (سه تا ده بار)، ۳= اغلب (بیش از ده بار) در طول بازه زمانی یک ماهه (۳۰ روز پیش) در نظر گرفته شده است. از داده‌های حاصل از این پرسشنامه در ارزیابی ناامنی غذایی در جامعه می‌توان به دو صورت کمی و کیفی در ارزیابی ناامنی غذایی در جامعه مورد بررسی استفاده کرد. امتیاز HFIAS سنجه‌ای پیوسته از درجه ناامنی غذایی خانوار در ماه گذشته است که از

موردن تعیین گردید. به ازای هر مورد ۲ نفر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. بنابراین در نهایت ۱۸۰ مورد و ۳۷۰ کنترل وارد مطالعه شدند.

$$\pi = \frac{(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2 [P_1(1-P_1) + P_2(1-P_2)]}{(P_1 - P_2)^2}$$

با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، ۱۸۰ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) که بیماری آنها برای اولین بار، با تشخیص پزشک متخصص، تشخیص داده شده بود به عنوان گروه مورد و ۳۷۰ نفر از میان سایر افراد مراجعه کننده به بیمارستان که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: سن ۱۸-۶۵ سال و ساکن آمل، معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از: داشتن بیماران قلبی مادرزادی و دریچه قلب، ابتلا به بیماری مزم میتوی، مصرف داروهای ضدبارداری در زنان، مصرف آمفتامین‌ها، ابتلا به پرفشاری خون، چربی خون، بارداری و شیردهی، ورزشکار حرفه‌ای بودن، اعتیاد.

روش گردآوری داده‌ها

شاخص‌های تن سنجی شامل قد و وزن شرکت کنندگان در مطالعه اندازه گیری و نمایه توده بدنی (BMI)^۱ از تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه شد. اضافه وزن و چاقی به این ترتیب تعریف شده است: $BMI < ۲۹/۹$ و $۲۵ \leq BMI \leq ۳۰$. وزن افراد با حداقل پوشش با استفاده از یک ترازوی دیجیتال با دقت ۱۰۰ گرم و قد با استفاده از متر نواری با دقت ۱/۰ سانتی‌متر در وضعیت ایستاده در کنار دیوار و بدون کفش در حالی که کتف‌ها در شرایط عادی قرار داشتند اندازه گیری شد. چک لیست حاوی مشخصات دموگرافیک شامل میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، جنس، سن، سابقه فامیلی دیابت، بیماری قلبی،

² Food Frequency Questionnaire, FFQ

³ United States Department of Agriculture

⁴ Household Food Insecurity Access Scale

^۱ Body Mass Index

پاسخ‌های مثبت افراد به پرسش‌ها بیشتر باشد و یا شرایط نامنی را با تکرار بیشتری تجربه کرده باشند، جزء گروه نامن طبقه بندی می‌شوند. در مطالعه حاضر افراد از نظر امنیت غذایی در دو گروه، امن و نامن (مجموع طبقه بندی‌های خفیف، متوسط و شدید) به دلیل کم بودن تعداد افراد در هر کدام از طبقه بندی‌ها، تقسیم بندی شدند.

مجموع کدهای دفعات وقوع پاسخ داده شده توسط خانوار برای ۹ پرسش به دست می‌آید. کمترین امتیاز ۰ و بالاترین امتیاز ۲۷ (خانواری که به هر ۹ پرسش پاسخ «اغلب» یعنی کد ۳ را داده است) می‌باشد. هر چه امتیاز فرد بالاتر باشد، نامنی غذایی بیشتری را تجربه کرده است. این معیار افراد را از نظر نامنی به چهار گروه تقسیم می‌کند: امن از نظر غذایی، نامن غذایی خفیف، متوسط و شدید. هر چه تعداد

جدول ۱. اقلام غذایی مورد استفاده در طبقه بندی کربوهیدرات‌های ساده و پیچیده

نوع کربوهیدرات	گروه غذایی	اقلام غذایی
کربوهیدرات‌های پیچیده	غلات	نان لواش، نان باگت، برنج، ماکارونی، بربری، سنتک، تافتون، جو و بلغور
	حبوبات	عدس، لپه، لوپیا، نخود، باقلاء، ماش، سویا
	سیب زمینی	سیب زمینی
کربوهیدرات‌های ساده	شیرینی جات	شیرینی تر، شیرینی خشک، انواع شکلات، انواع کیک و کلوچه، عسل، مربات، قند، شکر، نبات، آبنبات، حاوای شکری، نوشابه‌های گازدار، آبمیوه‌های صنعتی
نوشابه و نوشیدنی‌های صنعتی		

چهارم به ترتیب، بصورت مقادیر کمتر از ۳۲۷/۲۶، ۳۲۷/۲۶-۴۴۰/۳۹-۵۵۵/۵۲، ۴۴۰/۳۹-۵۵۵/۵۲ و بیشتر از ۵۵۵/۵۲ گرم در روز طبقه بندی شد. جهت محاسبه نسبت شانس (OR) در چارک‌های کربوهیدرات‌های پیچیده و ساده از آزمون رگرسیون لجستیک^۴ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-20 انجام و سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

جدول ۲ مقایسه ویژگی‌های پایه‌ای شرکت‌کنندگان را در دو گروه مورد و شاهد نشان می‌دهد. نتایج نشان داد که جنسیت، وضعیت تاہل و شاخص توده بدنی در دو گروه مورد و شاهد با یکدیگر تفاوت معناداری داشت. بیش از ۸۲ درصد از افراد در گروه مورد دارای امنیت غذایی و بیش از ۱۷ درصد دارای نامنی غذایی بودند. همچنین تقریباً ۸۵ درصد از اعضای گروه شاهد دارای امنیت غذایی امن و ۱۵ درصد

تجزیه و تحلیل داده‌ها

متغیرهای کمی بصورت میانگین \pm انحراف معیار و متغیرهای کیفی بصورت تعداد (درصد) گزارش گردید. نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی در بین دو گروه مورد و شاهد و همچنین در بین دو گروه امنیت غذایی امن و نامن در صورت نرمال بودن داده‌ها از آزمون تی مستقل^۱ و در صورت نرمال نبودن از آزمون من- ویتنی^۲ و برای مقایسه فراوانی متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای^۳ (در صورت لزوم فیشر تست) استفاده شد. برای کربوهیدرات‌های ساده، چارک اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب، بصورت مقادیر کمتر از ۵۰/۲۸-۸۶/۶۲، ۸۶/۶۲-۱۶۳/۲۴ و بیشتر از ۱۶۳/۲۴ گرم در روز و همچنین برای کربوهیدرات‌های پیچیده چارک اول، دوم، سوم و

¹ Independent T-test

² Mann Whitney U Test

³ Chi-Square

⁴ Multinomial Logistic Regression

صرف کربوهیدرات‌های ساده در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد ($194/67 \pm 157/74$ گرم در روز در گروه مورد و $93/0 \pm 72/8$ گرم در روز در گروه شاهد) بود و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ($p < 0.001$).

نالمن بوده اند ولی این تفاوت در دو گروه معنادار نبود. میانگین مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده ($468/26 \pm 199/93$ گرم در روز در گروه مورد و $455/55 \pm 178/48$ گرم در روز در گروه کنترل) اختلاف معناداری با یکدیگر نداشت. در حالی که میانگین

جدول ۲. مقایسه مشخصات پایه‌ای شرکت کنندگان در مطالعه

	شاهدها (N=۳۷۰)	مورددها (N=۱۸۰)	متغیرها
P-value*	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	
<0.001	(۵۴/۹) ۲۰۳ (۴۵/۱) ۱۶۷	(۳۱/۱) ۵۶ (۶۸/۹) ۱۲۴	مرد زن
	(۴۷/۸) ۱۷۷	(۱۵) ۲۷	۴۰<
<0.001	(۲۳) ۸۵ (۲۹/۲) ۱۰۸	(۲۱/۱) ۳۸ (۶۳/۹) ۱۱۵	۴۰-۵۰ ۵۰≥
	(۲۴/۳) ۹۰	(۳/۸) ۵	مجرد
<0.001	(۷۴/۹) ۲۷۷ (۰/۸) ۳	(۹۰) ۱۶۲ (۷/۲) ۱۳	متاهل طلاق گرفته
	(۲۷) ۱۰۰	(۵۸/۳) ۱۵۰	بیسواند و ابتدائی
<0.001	(۱۶/۲) ۶۰ (۳۵/۷) ۱۳۲ (۲۱/۱) ۲۸	(۱۶/۷) ۳۰ (۱۹/۴) ۳۵ (۵/۶) ۱۰	راهنمایی دیبلم دانشگاهی
	(۴۶/۵) ۱۷۲ (۵۳/۵) ۱۹۸	(۲۱/۱) ۳۸ (۷۹/۸) ۱۴۲	بله خیر
<0.001	(۱۳/۳) ۳۵ (۸۶/۷) ۲۲۹	(۵۳/۹) ۹۷ (۴۶/۱) ۸۳	بله خیر
0.94	(۳۵/۴) ۱۳۱ (۶۴/۶) ۲۳۹	(۴۳/۸) ۷۷ (۵۷/۲) ۱۰۳	سابقه فامیلی دیابت
0.969	(۲۴/۶) ۹۱ (۷۵/۴) ۲۷۹	(۲۴/۴) ۴۴ (۷۵/۶) ۱۳۶	سابقه فامیلی بیماری قلبی
0.16	(۴۳) ۱۵۹ (۵۷) ۲۱۱	(۵۳/۹) ۹۷ (۴۶/۱) ۸۳	سابقه فامیلی فشار خون
0.53	(۸۴/۹) ۳۱۴ (۱۵/۱) ۵۶	(۸۲/۸) ۱۴۹ (۱۷/۲) ۳۱	امن ناامن
<0.001	۹۳/۰۳±۷۲/۸	۱۹۴/۶۷±۱۵۷/۷۴	مصرف کربوهیدرات
0.45	۴۵۵/۵۵±۱۷۸/۴۸	۴۶۸/۲۶±۱۹۹/۹۳	(Mean±SD)(g/day) پیچیده

* Person's chi-square test

که بطور کلی، میانگین کربوهیدرات‌های پیچیده ($453/72 \pm 178/6$ گرم در روز در گروه امن، $491/5 \pm 217/9$ گرم در روز در گروه نالمن) و میانگین کربوهیدرات‌های ساده ($127/68 \pm 119/25$

در جدول ۳، میانگین مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده و ساده در بین افراد با نالمنی و امنیت غذایی در کل شرکت کنندگان، گروه مورد و شاهد بصورت جداگانه با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان داد

بین افراد با وضعیت امن و نامن غذایی در گروه مورد و گروه شاهد نیز تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت.

گرم در روز در گروه امن و $118/9 \pm 112/3$ گرم در روز در گروه نامن) اختلاف معناداری با یکدیگر نداشت. میانگین کربوهیدرات‌های پیچیده و ساده در

جدول ۳. مقایسه میانگین کربوهیدرات‌های پیچیده و ساده در بین افراد با نامنی و امنیت غذایی به تفکیک کل شرکت‌کنندگان، گروه مورد و گروه شاهد

گروه شاهد		گروه مورد		کل شرکت‌کنندگان		متغیر (gr/day)		
P ^۳	نامن (n=۵۶)	امن (n=۳۱۴)	P ^۲	نامن (n=۳۱)	امن (n=۱۴۹)	نامن (n=۸۷۷)	امن (n=۴۶۳)	
.۰/۴۶	$471/9 \pm 20.6/5$	$452/6 \pm 17.3/2$.۰/۱۲	$527/3 \pm 23.6/4$	$456/3 \pm 19.0/1$.۰/۱۳	$491/5 \pm 21.7/9$	$453/7 \pm 17.8/6$
.۰/۶۶	$89/1 \pm 6.5/3$	$93/7 \pm 7.4/12$.۰/۳۹	$172/8 \pm 15.3/8$	$199/2 \pm 15.8/7$.۰/۵۲	$118/9 \pm 11.2/3$	$127/6 \pm 11.9/25$

* داده‌ها بصورت انحراف معیار ± میانگین می‌باشند.

^۱ مربوط به مقایسه میانگین در بین افراد با وضعیت امن و نامن غذایی با استفاده از آزمون Mann Whitney U test در کل شرکت‌کنندگان می‌باشد.

^۲ مربوط به مقایسه میانگین در بین افراد با وضعیت امن و نامن غذایی با استفاده از آزمون Mann Whitney U test در گروه مورد می‌باشد.

^۳ مربوط به مقایسه میانگین در بین افراد با وضعیت امن و نامن غذایی با استفاده از آزمون Mann Whitney U test در گروه کنترل می‌باشد.

جدول ۴. نسبت شانس و فاصله اطمینان آن برای بیماری عروق کرونر قلب در کل شرکت‌کنندگان، گروه امن غذایی و گروه نامن غذایی بر اساس نوع کربوهیدرات مصرفی

OR (95% CI for OR)							گروه
P-trend	چارک چهارم	چارک سوم	چارک دوم	چارک اول	متغیر	گروه	
.۰/۱۵	۱/۶۲ (۰/۹۱-۲/۸۸)	.۰/۹۴ (۰/۰۵۳-۱/۶۷)	.۰/۶۸ (۰/۳۸-۱/۲۲)	۱	کربوهیدرات‌های پیچیده	کل شرکت‌کنندگان	
	۸/۳۶ (۴/۴-۱۵/۹۱)	۳/۲۶ (۱/۷۲-۶/۱۸)	۱/۵۹ (۰/۸۱-۳/۱۶)	۱	کربوهیدرات‌های ساده		
<.۰۰۱	(n=۱۳۷)	(n=۱۳۸)	(n=۱۳۸)	(n=۱۳۷)			
	۱/۵ (۰/۸۱-۲/۹۳)	۱/۰۵ (۰/۰۵۶-۱/۹۷)	.۰/۸۲ (۰/۴۴-۱/۵۴)	۱	کربوهیدرات‌های پیچیده	گروه امن غذایی	
<.۰۰۱	(n=۱۰۹)	(n=۱۲۰)	(n=۱۲۰)	(n=۱۱۴)			
	۸/۳۳ (۴/۱-۱۶/۹)	۳/۸۴ (۱/۸۷-۷/۸۷)	۱/۶۲ (۰/۵۵-۳/۴۷)	۱	کربوهیدرات‌های ساده		
<.۰۰۱	(n=۱۱۸)	(n=۱۱۶)	(n=۱۱۴)	(n=۱۱۵)			
	۱/۶ (۰/۴۳-۶/۵)	.۰/۵۵ (۰/۰۱۱-۲/۸۳)	.۰/۱۷ (۰/۰۳-۱/۱)	۱	کربوهیدرات‌های پیچیده	گروه نامن غذایی	
.۰/۴۵	(n=۲۶)	(n=۱۹)	(n=۲۶)	(n=۱۶)			
	۱۱/۷۹ (۲/۲۶-۶۱/۴)	۱/۵۲ (۰/۰۳۴-۶/۷۶)	۱/۶۴ (۰/۰۳۳-۸/۲)	۱	کربوهیدرات‌های ساده		
<.۰۰۸	(n=۲۲)	(n=۲۱)	(n=۲۲)	(n=۲۲)			

چارک‌های دوم و سوم مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده در مقایسه با چارک اول شانس ابتلای کمتری به بیماری عروق کرونر داشتند هر چند این اختلاف معنادار نبود. افزایش مصرف کربوهیدرات‌های ساده در هر سه گروه کل شرکت‌کنندگان، گروه امن و گروه نامن غذایی شانس ابتلا به بیماری عروق کرونر را افزایش می‌هد و این اختلاف در بین چارک‌ها معنادار بود. نتایج نشان داد که افراد در گروه نامن

در جدول ۴ نسبت شانس و فاصله اطمینان آن برای بیماری عروق کرونر قلب در بین چارک‌های کربوهیدرات‌های پیچیده و ساده در کل شرکت‌کنندگان، افراد دارای امنیت غذایی و افراد با وضعیت غذایی نامن پس از تعديل کردن متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تا هل محاسبه شده است. نتایج نشان داد که در کل شرکت‌کنندگان، گروه امنیت غذایی امن و گروه نامن غذایی، افراد در

نورد و همکاران (۲۴) بالاتر ولی نسبت به مطالعه مالزیای (۲۵) کمتر بود. مطالعه گلی^۱ و همکاران نشان داد که میانگین دریافت کربوهیدرات‌ها در افراد بیمار بصورت معناداری بالاتر از گروه کنترل بود (۲۶). مطالعه محمدپور و همکاران نشان داد که مصرف غذاهای با کیفیت پایین و کالری بالا حاوی کربوهیدرات‌های ساده باعث افزایش خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی می‌شود (۲۷). محمدزاده و همکاران نیز با بررسی وضعیت امنیت غذایی افراد به نتیجه مشابهی رسیدند (۲۸). در مطالعه انجام شده توسط هافرث^۲ و همکاران ارتباط منفی بین امنیت غذایی و مصرف کربوهیدرات‌ها مشاهده نشد، در حالی که در بین کودکان ۵ تا ۱۲ ساله آمریکایی، بین نامنی غذایی و چاقی در دختران ارتباط مشاهده شد، اما چنین ارتباطی در بین پسران دیده نشد (۲۹).

در مطالعه دستگیری و همکاران که با هدف تعیین عوامل موثر بر نامنی غذایی در شهر تبریز انجام شد، گزارش نمودند که میانگین مصرف نان و سبب زمینی در گروه نامن به طور معناداری بیشتر از گروه امن و میانگین بسامد مصرف برنج، میوه و لبنتیات در گروه نامن به طور معناداری کمتر از گروه امن بوده است (۳۰). در تشریح ارتباط معکوس بین نامنی غذایی و مصرف کربوهیدرات می‌توان بیان نمود هر دو نوع از گرایش‌ها به نوعی با سطح اجتماعی اقتصادی افراد در ارتباط می‌باشد، به طوری که ارتباط معکوس بین نامنی غذایی با وضعیت اقتصادی خانوار و متوسط درآمد خانوار در بررسی‌های متعددی مشاهده شده است. در پژوهش‌های دیگر نیز به ارتباط معکوس نامنی غذایی با درآمد خانواده و سطح تحصیلات اعضای خانوار اشاره شده است (۳۱،۳۲). شریف و همکاران در مالزی با توجه به رشد سریع اقتصادی و افزایش روزافزون چاقی در آن کشور تجمع چربی در بدن در نتیجه نامنی غذایی را در زنان روستایی

غذایی شناس ابتلای بیشتری به بیماری در مقایسه با گروه امن غذایی داشتند، بطوری که نسبت شناس در چارک چهارم برای کربوهیدرات‌های ساده در میان کل شرکت کنندگان $OR = 1/36$ و $p < 0.001$. گروه غذایی امن (۳۳) $OR = 1/33$ و $p < 0.001$ و گروه غذایی نامن ($OR = 11/79$ و $p = 0.008$) می‌باشد.

بحث

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد از افراد در گروه مورد و شاهد دارای امنیت غذایی بودند. بیش از ۱۷ درصد موردها و ۱۵ درصد از اعضای گروه شاهد دارای نامنی غذایی بودند ولی این تفاوت در دو گروه معنادار نبود. افراد در چارک‌های بالای مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده شناس ابتلای کمتری به بیماری عروق کرونر داشتند، هر چند این اختلاف معنادار نبود. افراد در چارک‌های بالای مصرف کربوهیدرات‌های ساده شناس ابتلای بیشتری به بیماری عروق کرونر داشتند، که این شناس در گروه غذایی نامن بالاتر می‌باشد.

مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه نامنی غذایی در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معناداری با هم نداشت ولی در گروه مورد فراوانی بیشتری داشت. بطور کلی، میانگین کربوهیدرات‌های پیچیده در بین موردها و شاهدها اختلاف معناداری با یکدیگر نداشت با این حال میزان دریافت کربوهیدرات‌های ساده در گروه مورد بطور معناداری از گروه شاهد بیشتر بود. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که میانگین مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده در بین افراد با نامنی و امنیت غذایی در کل شرکت کنندگان، گروه مورد و شاهد اختلاف معناداری با یکدیگر نداشت. میزان مصرف کربوهیدرات‌های ساده در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود ولی در بین دو زیر گروه امن و نامن غذایی تفاوت معناداری نداشت.

مطالعه حاضر مovid این نکته است که شیوع نامنی غذایی در جامعه مورد بررسی در مقایسه با مطالعه

¹ Gholi

² Hofferth

استفاده از یک بیمارستان برای نمونه‌گیری اشاره کرد، هرچند تنها مرکز بیماران قلبی در حال حاضر در شهرستان آمل این بیمارستان می‌باشد. محدودیت دیگر این مطالعه، عدم همسان سازی گروه مورد و کنترل از نظر برخی مشخصات دموگرافیک بود، هرچند که محاسبه نسبت شانس این متغیرها تعديل شده‌اند. از مزیت‌های مطالعه می‌توان به حجم نمونه بالا و همچنین طراحی مورد- شاهدی بجای مطالعه مقطوعی اشاره کرد.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت معنی‌داری از لحاظ امنیت غذایی بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد، ولی در هر سه گروه کل شرکت‌کنندگان، گروه امن غذایی و همچنین گروه نامن غذایی مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده شانس ابتلا به بیماری عروق کرونر را کاهش و مصرف مقادیر بالاتر کربوهیدرات‌های ساده شانس ابتلا به آن را افزایش می‌دهد و این شانس در گروه نامن غذایی بالاتر می‌باشد. این نتایج نشان داد که نامنی غذایی و مصرف کربوهیدرات ساده ممکن است یکی از عوامل متعددی باشد که سبب بیماری قلبی عروقی می‌گردد. لذا انجام مطالعات کوهورت و آینده‌نگر برای بررسی دقیق‌تر ارتباط امنیت غذایی و بیماری عروق کرونر توصیه می‌گردد.

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه نویسنده اول می‌باشد که با کد IR.umsu.rec.1395.69 توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مورد تایید قرار گرفته است. از همه همکاران محترمی که به هر نحو در انجام این پژوهش همکاری نمودند و همچنین افراد شرکت‌کننده در مطالعه تقدیر و تشکر بعمل می‌آید.

بررسی کردند. زنان خانوارهای نامن غذایی، از نظر میزان تحصیلات، درآمد خانوار و درآمد سرانه، پایین‌تر بودند، کودکان بیشتری داشتند و غالباً خانه‌دار بودند (۲۵).

نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که افراد در چارک‌های بالای مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده در مقایسه با چارک اول شانس ابتلای کمتری به بیماری عروق کرونر داشتند، هر چند این اختلاف در دو گروه افراد با وضعیت غذایی امن و نامن معنادار نبود. در حالی که افراد در چارک‌های بالای مصرف کربوهیدرات‌های ساده شانس ابتلای بیشتری به بیماری عروق کرونر داشتند و این شانس در گروه نامن غذایی بالاتر از افراد با وضعیت امن غذایی بود. نتایج مطالعه Grilo¹ و همکاران نشان داد که بیماران با وضعیت غذایی امن کاهش معناداری را در فشارخون داشتند، در حالی که تغییرات آن در گروه نامن غذایی معنادار نبود (۳۲). آخوندان² و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که میزان قند خون ناشتا در افراد با سهم بالای مصرف نان و برنج بطور معناداری بالاتر از سهم پائین می‌باشد (۳۳). همچنین قمی و همکاران با بررسی ارتباط امنیت غذایی با تنوع غذایی در افراد بالای ۴ سال تهران به ارتباط معکوس بین نمره امنیت غذایی و تنوع غذایی پی برند (۳۴). با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که در گروه نامن غذایی عواملی چون وضعیت اجتماعی- اقتصادی که ارتباط مستقیمی با چگونگی دسترسی افراد به مواد غذایی و در نتیجه عدم تعادل، تنوع و کمبود مواد مغذی در الگوی غذایی آنها می‌شود، شانس ابتلا به بیماری قلبی- عروقی را بالا می‌برد.

از محدودیت‌های این مطالعه می‌توان به طراحی مورد- شاهدی بجای مطالعه آینده‌نگر و کوهورت و همچنین استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و

¹ Grilo

² Akhounan

References

- 1-Gillinov M, Steven N. Heart 411: The Only Guide to Heart Health You'll Ever Need. 3rd Ed. New York. 2012: 10-15.
- 2-Bloom DE, Cafiero ET, Jané-Llopis E, Abrahams-Gessel S, Bloom LR, et al. The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases. Geneva: World Economic Forum. 2011:21-23.
- 3-Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJ. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: Systematic analysis of population health data. Lancet. 2006; 27 (367):1747-57.
- 4-Samvat T, Hozatzadeh E, Afkhami MS, Mahdavi A, Bashti S, Pouraram H, et al. Prevention and control of cardiovascular disease. Javan. 2013; 222-230.
- 5-World Health Organization. Non-communicable Diseases (NCD) Country Profiles, Iran (Islamic Republic of), Proportional Mortality total Death, all ages, both sexes. 2014:93
- 6-Khosravi-Boroujen H SN, Mohammadifar N, Sajjad F, Maghroun M, Asgar S, Rafieian-kopaei M, Azadbakht L. White rice consumption and CVD risk factors among iranian population. J Health Popul Nutr. 2013; 3(2):252-61.
- 7-Rundle A, Neckerman KM, Freeman L, Lovasi GS, Purciel M, Quinn J, et al. Neighborhood food environment and walkability predict obesity in New York City. Environ Health Perspect. 2009; 117(3):442-7.
- 8-Streel S, Donneau AF, Hoge A, Majerus S, Kohl P, Chapelle JP, et al. Socioeconomic impact on the prevalence of cardiovascular risk factors in Wallonia, Belgium: a population-based study. Biomed. Res. Int. 2015; 2015: 1-10.
- 9-Dixon L, Winkleby MA, Radimer KL. Dietary intakes and serum nutrients differ between adults from food-insufficient and food-sufficient families: third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994. J. Nutr. 2001; 131(4): 1232–1246.
- 10-Ford ES. Peer reviewed: food security and cardiovascular disease risk among adults in the United States: findings fromthe National Health and Nutrition Examination Survey, 2003–2008. Prev. Chronic Dis. 2013; 10: 1-10.
- 11-Sirotin N, Hoover DR, Shi Q, Anastos K, Weiser SD. Food insecurity with hunger is associated with obesity among HIV-infected and at risk women in Bronx, NY. PLoS One. 2014; 9(8): 1-6.
- 12-Alimardani Z, Kazemi F, Estaki T, Mirmiran P. Household food Security in Iran: A systematic review of Iranian studies. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. 2015; 24 (87): 63-76.
- 13-Gharib H. Prospects for food security in the Islamic Republic. Journal of strategy. 2012; 21(65): 345-369.
- 14-Tanhaei M, Zare A, Shirani Bidabadi F, Joulaei R. Assessment of Food security status by using food diversity index: A case study in rural city near Shiraz, Fars Province. Journal of village and Development. 2015; 4: 17-22.
- 15-Seligman HK, Laraia BA, Kushel MB. Food insecurity is associated with chronic disease among low-income NHANES participants. J. Nutr. 2010; 140 (2): 304–310.
- 16-Seligman HK, Bindman AB, Vittinghoff E, Kanaya AM, Kushel MB. Food insecurity is associated with diabetesmellitus: results fromthe National Health Examination and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999–2002. J. Gen. Intern Med. 2007; 22(7): 1018–1023.
- 17-Shin JI, Bautista LE, Walsh MC, Malecki KC, Nieto FJ. Food insecurity and dyslipidemia in a representative population-based sample in the US. Prev Med. 2015; 77: 186–190.
- 18-Rose D, Oliveira V. Nutrient intakes of individuals from food-insufficient households in the United States. Am. J. Public Health. 1997; 87(12): 1956–1961.
- 19-Amani R, Noorizadeh M, Rahmannian S, Afzali N, Haghhighizadeh MH. Nutritional related cardiovascular risk factors in patients with coronary artery disease in Iran: A case-control study. Nutrition Journal. 2010; 9:70-75.
- 20-Cheraghian B, Nedjat S, Mansournia MA, Majdzadeh R, Mohammad K, Vaez-Mahdavi MR, Faghihzadeh S, HaeriMehrizi AA, Asadi-Lari M. Different patterns of association between education and wealth with non-fatal myocardial infarction in Tehran, Iran: A population-based case-control study. Med J Islam Repub Iran. 2015; 29(160):1-8.

- 21-Asghari G, Rezazadeh A, Hosseini-Esfahani F, Mehrabi Y, Mirmiran P, Azizi F. Reliability, comparative validity and stability of dietary patterns derived from an FFQ in the Tehran Lipid and Glucose Study. *Br J Nutr.* 2012; 108(6):1109-17.
- 22-Nasrabadi FM, Omidvar N, Houshyar A, Mehrabi Y, Abdollahi M. The Relationship between food insecurity and body weight status of adult members of Iranian households. *Journal of Nutrition and Food Technology.* 2008; 3(2): 41-53.
- 23-Salarkia N AM, Amini M, Eslami Amirabadi M. Validation and use of the HFIAS questionnaire for measuring household food insecurity in Varamin-2009. *Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.* 2011; 13(4):374-383.
- 24-Nord M, Andrews M, Carlson S. Household food security in the United States, 2006. *ERS Economic Research Report.* 2007; 49:1-2.
- 25-Shariff ZM, Khor GL. Obesity and Household Food Insecurity: Evidence from a sample of rural households in malaysian. *Eur J Clin Nutr.* 2005; 59(9):1049-58.
- 26-Gholi Z, Heidari-Beni M, Feizi A, Iraj B, Askari GH. The characteristics of pre-diabetic patients associated with body composition and cardiovascular disease risk factors in the Iranian population. *J Res Med Sci.* 2016; 21:1-7.
- 27-Mohamadpour M, Fouladvand MA, Kisemi M. Food insecurity as a risk factor for obesity among low-income women bushehr. *South Medical Journal.* 2010; 13(4): 263-272.
- 28-Mohamadzadeh A, Dorosty-Motkagh A, Eshraghiyan MR. Assessment of Food security status of households and consumption of foods high school students in Isfahan. *Journal of Epidemiology.* 2011; 7 (1):38-43.
- 29-Hofferth SL, Curtin S. Poverty, food programs, and childhood obesity. *J Policy Anal Manage.* 2005; 24(4):703-26.
- 30-Dastghiri S, Mahboub S, Toutounchi H, Ostadrehami A. Factors affecting food insecurity in the Tabriz city. *Journal of University of Medical Sciences.* 2006; 6(3): 233-239.
- 31-Dorosty-Motkagh A, Karamsoltani Z, Jazayeri A, Siyasi F, Eshraghiyan MR. The Relationship between food security and obesity and family factors associated. *Journal of Faculty of Health and Research Institute.* 2008; 6(1): 1-9.
- 32-Grilo SA, Shallcross AJ, Ogedegbe G, Odedosu T, Levy N, Lehrer S, et al. Food Insecurity and Effectiveness of behavioral interventions to reduce blood pressure, New York City, 2012–2013. *Prev Chronic Dis.* 2015; 12:1-7.
- 33-Akhoundan M, Shadman Z, Jandaghi P, Aboeerad M, Larijani B, Jamshidi Z, et al. The Association of Bread and Rice with Metabolic Factors in Type 2 Diabetic Patients. *PLoS ONE.* 2016; 11(12): 1-12.
- 34- Ghomi MH, Mirmiran P, Amiri Z, Asghari G, Sadeghian S, Sarbazi N, Azizi F. The Association of Food Security and Dietary Variety in Subjects Aged Over 40 in District 13 of Tehran. *Journal of Endocrinology and Metabolism.* 2012; 14 (4): 360-367.